



Åge Molversmyr & Morten A. Bergan (NIVA)

Overvåking av Jærvassdrag 2010 – Datarapport –

Rapport IRIS – 2011/052

Prosjektnummer: 7941873

Prosjektets tittel: Overvåking av Jærvassdragene 2010

Oppdragsgiver(e): Rogaland Fylkeskommune

Forskningsprogram:

ISBN: 978-82-490-0724-0

Gradering: Åpen

Stavanger, 26.3.2011

Åge Molversmyr

Sign.dato

Prosjektleder

Asbjørn Bergheim

Sign.dato

Kvalitetssikrer

Arild Johannessen

Sign.dato

Forskingssjef

FORORD

International Research Institute of Stavanger (IRIS) har har i samarbeid med NIVA utført overvåking av innsjøer og elver Jærvassdragene, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Sen inngåelse av avtale gjorde at prøvetaking i innsjøene først startet opp i slutten av mai, med månedlig prøvetaking frem til oktober (6 ganger). Som foregående år er den dynamiske vårperioden dermed ikke inkludert i innsjøundersøkelsene i 2010.

Overvåningsprogrammet har fokus på økologisk tilstand, og omfatter samtlige av de største og viktige innsjøene på Jæren. Etter at samtlige innsjølokaliteter ble undersøkt i 2004, har overvåningsprogrammet hatt en rullering med hensyn til hvilke innsjøer som undersøkes, slik at hver innsjø blir undersøkt med en frekvens på 2-4 år. I 2010 ble Hålandsvatnet, Stokkelandsvatnet, Edlandsvatnet, Limavatnet, Mosvatnet (Time) og Frøylandsvatnet (sør) undersøkt. I tillegg ble Oltedalsvatnet for første gang inkludert i overvåningsprogrammet.

Det er også tatt månedlige prøver (utført av kommunene) i elver og bekker som omfattes av overvåningsprogrammet, og disse er analysert for innhold av næringsstoffer (se tabeller i vedlegg). I tillegg er det samlet inn data fra andre relevante lokaliteter som overvåkes i annen regi, nærmere bestemt data fra Skas-Heigre kanalen og Timebekken som overvåkes gjennom JOVA-programmet, utløpet av Orre-elva som overvåkes gjennom det statlige elveliførselsprogrammet, og fra Håelva og Figgjo hvor Fylkesmannen i Rogaland drifter prøvestasjoner. I rapporten er det også inkludert resultater fra bekker og elver som overvåkes i regi av Gjesdal, Sola og Randaberg kommune. Resultatene er vist i figurer i datavedlegget.

Prøver av begroingsalger ble tatt ved de samme elve-/bekkelokalitetene som tidligere år, og undersøkt med tanke på indikatorarter. Forurensningstilstanden som begroingsalgene indikerer er fastsatt med utgangspunkt i en indikatorverdi som er harmonisert med Klifs tidligere klassifiseringssystem. I 2010 ble det også tatt prøver av begroingsalger i et utvalg av lokalitetene etter metodikk som legges til grunn i Vannforskriften. Dette ble utført i samarbeid med Suzanne Schneider (NIVA), hvor resultatene i utgangspunktet var tiltenkt brukt for å styrke grunnlaget for å klassifisere elvelokalitetene etter det nye klassifiseringssystemet. En egen rapport om dette er under utarbeidelse.

Høsten 2010 ble det også gjort undersøkelser av fisk (el-fiske) og bunndyr i et utvalg av elvelokalitetene.

I figurer i denne rapporten er resultater fremstilt i forhold til det nye klassifiseringssystemet etter Vannforskriften (EUs Vanndirektiv), og i tekstdelen i rapporten er de viktigste resultatene oppsummert i forhold til dette nye klassifiseringssystemet.

Prøvetaking og registreringer i innsjøene er utført av Åge Molversmyr, Kjell Birger Øysæd og Asbjørn Bergheim ved IRIS. Begroingsalger ble samlet inn av Åge Molversmyr. Fiskeundersøkelser (el-fiske) og prøvetaking av bunndyr ble utført av Morten A. Bergan ved NIVA i samarbeid med Åge Molversmyr (IRIS). Prøver for kjemiske analyser i bekker og elver er samlet inn av personell fra Hå kommune (Fuglestadåna, Kvassheimsåna, Årslandsåna, Søndre og Nordre Varhaugselv, Tverråna og Salteåna), Time kommune (Frøylandsåna), Gjesdal kommune (Gjesdalbekken og Figgjo v/Auestad) og Sandnes kommune (Storåna).

Akkrediterte kjemiske analyser er utført av NIVA. Analyse av planteplankton og begroingsalger er utført av dr. philos Øyvind Løvstad (Limno-Consult), mens analyse av dyreplankton er utført av dr. philos Anders Hobæk (NIVA).

Bearbeiding og sammenstilling av data er utført av Åge Molversmyr (IRIS). Data om fisk og bunndyr er bearbeidet og rapportert av Morten A. Bergan (NIVA), og egen rapport om dette finnes som vedlegg. Faglig kvalitetssikrer for prosjektet har vært seniorforsker Asbjørn Bergheim (IRIS).

Prosjektet har vært finansiert av Rogaland fylkeskommune, med tilskudd fra Klif.

Stavanger, 26. mars 2011

Åge Molversmyr, prosjektleader

Nøkkelord: Aksjon Jærvassdrag; overgjødsling; miljøtilstand; vannkvalitet; overvåking

INNHOLD

| | |
|--|----|
| OPPSUMMERING AV RESULTATER | 1 |
| Innsjøer | 2 |
| Elver – næringsstoffer | 3 |
| Elver – begroingsalger | 3 |
| Elver – bunndyr | 3 |
| Elver – fisk | 4 |
| Tilstand og utvikling i vassdragene..... | 4 |
| FIGURER OG DATA | 9 |
| Figurer: tilstand og utvikling i innsjøene | 11 |
| Figurer: tilstand og utvikling i elver og bekker..... | 17 |
| Tabeller: temperatur og oksygen i innsjøene i 2010..... | 34 |
| Figurer: temperatur og oksygen i innsjøene i 2010..... | 38 |
| Tabeller: analyser og feltmålinger i innsjøene i 2010 | 41 |
| Tabeller: plantaplankton i innsjøene i 2010..... | 43 |
| Figurer: algebiomasse i innsjøene i 2010 | 48 |
| Tabeller: algetoksiner målt i 2010 | 49 |
| Tabeller: dyreplankton i innsjøene i 2010..... | 50 |
| Figurer: dyreplankton i innsjøene i 2010 | 57 |
| Figurer: målinger i innsjøene i 2010 | 58 |
| Tabeller og figurer: målinger i elver og bekker i 2010..... | 61 |
| Tabeller: begroingsalger i elver og bekker i 2010 | 63 |
| Tabeller og figurer: bekker og elver overvåket i kommunal regi | 64 |
| RAPPORT OM BUNNDYR OG FISK..... | 73 |

OPPSUMMERING AV RESULTATER

Prøvetakingsstedene som har inngått i undersøkelsene i 2010, og som er omhandlet i denne rapporten, er vist i figur 1.



Figur 1. Overvåkingslokalisiteter i 2010



Figur 2. Bekker og elver overvåket i kommunal regi.

I tillegg til de ordinære overvåkingsstasjonene er det i denne rapporten tatt med resultater fra overvåking som blir utført i kommunal regi. Dette gjelder månedlige prøver tatt i Oltedalsvassdraget og i øvre deler av Figgjo i Gjesdal kommune, Bøkanalen i Randaberg kommune, 12 bekker og kanaler i Sola kommune og 5 bekker ved Bjårvatnet i Hå kommune (figur 2). Resultatene fra disse elvene og bekkene er gjengitt i figurer og tabeller i datavedlegget.

Innsjøer

I innsjøene var det stabil temperatursjiktning gjennom sommeren, og både i Stokkelandsvatnet, Oltedalsvatnet og Limavatnet var det fortsatt temperatursjiktning ved siste prøvetaking i midten av oktober. Oksygenavtaket i det stagnerte bunnvannet var betydelig i de fleste innsjøene, og med unntak av Oltedalsvatnet, Limavatnet og Edlandsvatnet var det oksygenfritt ved bunnen i mot slutten av juni. Dette gjelder også for Mosvatnet i Time, der forholdene i overflatelaget (klorofyll og fosfor) ellers indikerte relativt næringsfattige forhold (se nedenfor).

Av innsjøene fremsto Hålandsvatnet som den klart mest eutrofe basert på gjennomsnittlig algebiomasse, klorofyll- og fosforinnhold. Her var det som de siste årene en kraftig oppvekst av blågrønnalgen *Planktothrix mougeotii*, som holdt stand gjennom hele sesongen (og helt til isen la seg sent på høsten). Det ble også dette året registrert høyt innhold av algetoksiner i vannet, som medførte baderestriksjoner. Algebiomasse (*Planktothrix*) var hele 14 mg/l i slutten av august (og nesten det dobbelte i en prøve tatt nær land i slutten av november). Også Frøylandsvatnet og Stokkelandsvatnet hadde høy algebiomasse, og basert på dette må de begge regnes som eutrofe (næringsrike) innsjøer. Her var også blågrønnalger et vesentlig innslag i plantoplanktonet; mest i Frøylandsvatnet der gruppen *Gomphosphaeria* dominerte, og noe mindre i Stokkelandsvatnet der gruppen *Aphanizomenon* dominerte. I Hålandsvatnet medførte høy algeproduksjon at pH i overflatevannet var høy (pH > 9) i store deler av juni og juli.

For de andre innsjøene tilsier biomasse og sammensetning av plantoplanktonet at både Oltedalsvatnet, Edlandsvatnet og Mosvatnet i Time er mindre næringsrike (oligo-mesotrof gruppe), mens det i Limavatnet ble observert relativt høy biomasse av kiselalger ved den første prøvetakingen i slutten av mai (som kan indikere noe høyere næringsinnhold). Dette var antakelig på slutten av våroppblomstringen, og en kan ikke utelukke at lignende biomassetopper i de andre innsjøene mangler i datamaterialet siden prøvetaking ble igangsatt først i slutten av mai.

Prøver av dyreplanktonet viste relativ dominans av såkalte mikrofiltrerere (små hjuldyr), som er lite effektive algebeiteiere, i de fleste innsjøene. Innslaget av den store vannloppen *Daphnia galeata* (som er en særlig effektiv algebeiter) var moderat, og høyest i Frøylandsvatnet. Her var det høyere tetthet av *Daphnia* enn foregående år, men lavere enn i perioden 2006-2008. Forekomsten av *Daphnia* regnes å kunne påvirkes i stor grad av planktonspisende fisk, og det nevnes at det ble gjort en utfisking av slike fiskeslag i Frøylandsvatnet høsten 2010 som ga relativt lav fangst i forhold til tidligere utfiskinger (Harald Lura, Ambio rapport 10110-1, 2010). Utviklingen i dyreplanktonet i Frøylandsvatnet bør følges i perioden fremover.

Elver - næringsstoffer

Prøvetakingen i elvene viser at næringsstoffinnholdet varierer betydelig, og som vanlig var de høyeste fosforkonsentrasjonene om ettersommeren og høsten når nedbørmengden øker. Generelt var nivåene av næringsstoffer relativt like det en fant i 2009 i de fleste elvene. I Frøylandsåna var fosforinnholdet tilbake på nivå med de foregående årene, etter at det i 2009 var forhøyet (og som ble antatt satt i sammenheng med flomepisoder og høy partikkelskje transport). Også i enkelte andre prøvelokaliteter (Timebekken, utløp Orre, og kanskje Håelva) var det en viss nedgang i fosforinnholdet i forhold til 2009, og nitrogeninnholdet synes å være nedadgående noen steder (Skas-Heigre, utløp Orre). Men i vassdragene sør på Jæren var nitrogeninnholdet høyere enn foregående år.

Generelt er det ingen klare endringstrenger mht. innhold av næringsstoffer i elvene, og variasjoner fra år til år kan godt være uttrykk for underliggende naturgitte variasjoner (værforhold/nedbørmönster og avrenning).

Elver - begroingsalger

Vurdering av begroingsalger ved en prøvelokalitet er basert på forekomst av indikatorarter. En rekke indikatorarter av kiselalger og blågrønnalger er identifisert, og er tildegnede en indikatorverdi som er harmonisert med tilstandsklassene i det tidligere SFT-systemet. Den generelle tilstanden beregnes som den midlere indikatorverdi for de forekommende artene. Det ble også tatt prøver fra 12 av lokalitetene etter den nye metodikken som vil bli benyttet etter Vannforskriften (men hvor grenseverdier som skal benyttes i klassifiseringen ikke er fastsatt ennå), og resultatene av dette vil bli presentert i en egen rapport som er under utarbeidelse (data også vist i tabell 3).

Resultatene for 2010 var ganske samsvarende med resultatene fra foregående år, og i tabell 1 er resultater fra alle årene vist sammen med tilstandsklassen som fosformålingene i 2010 indikerer. For enkelte lokaliteter indikerer resultatene en bedre tilstand enn hva de kjemiske målingene tilsier, og forekomst av grønnalger (som ikke er med blant indikatorartene) kan tyde på at noen lokaliteter er mer belastet enn det som fremgår av tabellen. For lokalitetene hvor det er målt lavest fosforinnhold (øverst i Figgjo, Fuglestadåna og kanskje Ogna) indikerer begroingsalgene noe mer belastning enn det fosformålingene skulle tilsi.

Elver - bunndyr

Økologisk tilstand ved bruk av bunndyr som kvalitetselement er kartlagt ved 8 utvalgte elvelokaliteter (se figur 1). Resultatene viser at 3 bunndyrstasjoner (Svilandsåna, Figgjo ved Auestad og Gjesdalsbekken) klassifiseres til god økologisk tilstand (figur 3), noe som betyr at stasjonsområdets miljøkvalitet er innenfor den nye vannforskriftens miljømål på undersøkelses-tidspunktet. For de andre bunndyrstasjonene vil 3 lokaliteter (Figgjo ved Grudavatn, Frøylandsåna og Straumåna) klassifiseres til moderat økologisk tilstand, med kun små avvik fra et forventet miljømål iht. vannforskriften.

Bunndyrfaunaen på stasjonene i Storåna og Orre ved utløp har en miljøkvalitet som har større avvik fra miljømålet på undersøkelsestidspunktet, og klassifiseres til å ha en dårlig økologisk tilstand. Nøyere omtale av resultatene finnes i egen rapport i vedlegget.

Elver - fisk

Undersøkelser på yngel-/ungfiskbestanden av laksefisk ble også gjennomført på de samme lokalitetene som for bunndyrene. Resultatene fra fiskeundersøkelsene er vurdert i tråd med den nye vannforskriftens og vanndirektivets tilnærming til laksefisk som kvalitetselement for å klassifisere økologisk tilstand og miljøkvalitet i ferskvann. Det er ikke foretatt en klassifisering av økologisk tilstand ved bruk av laksefisk som kvalitetselement på bakgrunn av undersøkelsen i 2010, da det foreløpig ikke eksisterer en nasjonal, standardisert tilnærming eller metodikk for dette. Resultatene fra undersøkelsen er imidlertid vurdert i tråd med et pågående arbeidet for å finne frem til nasjonale kriterier på dette feltet.

Yngel-ungfisk av laksefisk i Svilandsåna, Straumåna, Gjesdalbekken og Figgjo ved innløp Grudavatn vurderes å ha en tilstand som kan være tilfredsstillende i forhold til et framtidig miljømål for disse vannforekomstene etter ny vannforskrift. Storåna, Figgjo ved Auestad og Frøylandsåna vurderes å ha såpass stor reduksjon i bestanden av yngel-/ungfisk at tilstanden ikke er forenlig med et framtidig miljømål for disse vannforekomstene. Stasjonen nederst i Orrevassdraget har ikke naturlige, hydromorfologiske forutsetninger for å kunne foreta en vurdering av tilstanden til fiskesamfunnet i stasjonsområdet. Nøyere omtale av resultatene finnes i egen rapport i vedlegget.

Fiskeundersøkelsen ble gjennomført på et noe ugunstig tidspunkt i forhold til kriteriene for bruk av lakefisk som kvalitetselement på miljøkvalitet og økologisk tilstand, da vannføringen var noe høy, vanntemperaturen lav og tidspunktet noe sent på året (medio november).

Erfaringsgrunnlaget for fiskesamfunn i vassdrag som omfattes av denne undersøkelsen bør økes i tiden som kommer, og fokus rettes opp mot miljømål angitt etter vanndirektivet og ny vannforskrift. Det betyr i tillegg at vannforekomster som potensielt kan ha status som Sterkt Modifiserte Vannforekomster må avklares, og videre at fokus på forhold som kontinuitet og frie vandringsveier for laksefisk og ål må vies større oppmerksamhet i tillegg til vassdragets vannkvalitet.

Tilstand og utvikling i vassdragene

I det følgende omtales hovedtrekkene med hensyn til tilstand og utviklingen i vassdragene, og klassifisering etter forvaltingens nye klassifiseringssystem er vist så langt det har vært mulig.

I Stokkelandsvatnet i Storånavassdraget var tilstanden ganske lik den som ble observert ved forrige innsjøprøvetaking i 2008. Selv om klorofyllnivåene totalt sett var lavere enn tidligere observert, var det en betydelig oppblomstring av blågrønnalger (*Aphanizomenon*) høsten 2010. I Storåna er fosfor- og nitrogeninnholdet fortsatt betydelig, men fosforinnholdet var litt lavere enn foregående år, og har hatt en avtakende trend de siste 4 årene.

I Oltedalsvatnet (som ble inkludert for første gang i prøvetakingen dette året) har en ikke tilstrekkelig med data til å vurdere eventuelle utviklingstrenger, men det var i 2010 god tilstand både mht. algemengde (klorofyll) og fosforinnhold. I forhold til økologisk tilstand må en imidlertid her ta hensyn til at Oltedalsvatnet er en regulert innsjø med betydelig reguleringshøyde (normalt 3-5 meter; Magnus Landstad, Lyse, pers. medd.), som gjør at en antakelig ikke vil kunne ha "god tilstand" her (jamfør vurderingskriterier (klassegrenser) angitt i klassifiseringsveilederen; Veileder 01:2009, Direktoratsgruppa for vanndirektivet).

I Figgjo ved Bore bru var både fosfor- og nitrogeninnholdet på nivå med foregående år, og en kan ikke se noen bestemte trender her. Som nevnt i tidligere rapporter har det her vært målt ekstremverdier for fosfor som er valgt utelatt fra datagrunnlaget, og slike ble også observert i 2010. [Prøvetakingen i Figgjo skjer ved at det samles ukentlige blandprøver ved en automatisk prøvestasjon, men i enkelte blandprøver har det vært målt usannsynlig høyt fosforinnhold. Dersom det var reelt at Figgjo hadde fosforinnhold på flere hundre mikrogram pr. liter i flere av

Tabell 1. Tilstand / forurensningsgrad anslått ved analyser av begroingsalger.

| Lokalitet | Begroingsalger | | | | | | | Kjemi (Tot-P) |
|-------------------------------------|--------------------|------|------|------|----------|------|------|----------------|
| | Anslått SFT-klasse | | | | Tilstand | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 |
| Ims-Lutsi: Svilandsåna v/Kyllesvtn. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Storåna: Ved jernbanen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Moderat/Dårlig |
| Oltedal: Oppstrøms Ragstjørna | | | | | | 2(3) | 2(3) | |
| Figgjo: Figgjo v/Auestad | | | | | | 3(4) | 2(3) | Svært god |
| Gjesdalbekken | | | | | | 3(4) | 3 | Svært god |
| Straumåna | 3 | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2 | 2 | 3 | |
| Foss-Eikeland | 3 | 3 | 2(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Innløp Grudavatn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kvernbekken | 2(3) | 4 | 3(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Skas-Heigre | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Svært dårlig |
| Ved Bore bru | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Moderat |
| Orre: Frøylandsåna | 3(4) | 4 | 4(5) | 4 | 5 | 5 | 5 | Moderat/Dårlig |
| Andabekken | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Timebekken | 3 | 3 | 4 | 4 | 3(4) | 4 | 3 | Svært dårlig |
| Roslandsåna | 3 | 3(4) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Orre-elva v/utløp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(4) | 5? | 4 | Dårlig |
| Håelva: Nedstrøms Undheim | 2(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Innløp Taksdalsvatn (N) | 2(3) | 3 | 2 | 2(3) | 2 | 2 | 2 | |
| Fotland | 3(4) | 4 | 3 | 3(4) | 3 | 3 | 4 | |
| Tverråna | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Moderat/Dårlig |
| Bekk v/Nesheim | 5 | 4(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Håelva v/utløp | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Moderat/Dårlig |
| Salteåna | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Svært dårlig |
| Nordre Varhaugselv | 3 | 5(4) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Dårlig |
| Søndre Varhaugselv | 3 | 4 | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 3 | 3 | Dårlig |
| Årslandsåna | 3 | 5 | 5 | 4(5) | 4 | 4 | 4 | Dårlig |
| Kvassheimsåna | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderat |
| Fuglestadåna | 3 | 3 | 4 | 4 | 4(5) | 4 | 3 | Svært god |
| Ogna v/Hølland bru | | | | | 2(3)? | 2 | | Svært god |

SFTs tilstandsklasser:

- 1 (I): Meget god
- 2 (II): God
- 3 (III): Mindre god
- 4 (IV): Dårlig
- 5 (V): Meget dårlig

For tilstand basert på total fosfor er det benyttet klassengrenser for dette elementet angitt i "Klassifisering av miljøtilstand i vann", Veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet).

Vanntyper er for de fleste elvene antatt med utgangspunkt i målinger av kalsium og farge, og for noen basert på verdier for nærliggende lokaliteter. Vurderingene er generelt usikre.

årets uker, ville tilstanden i vassdraget ganske sikkert ha vært en annen enn den som observeres i dag. Høye fosforverdier kan skyldes at inntaket til prøvestasjonen periodevis har tatt inn slam som ikke er representativt for vannet i elva. En har derfor valgt å skjønnsmessig utelate alle verdier som er høyere enn 100 µg/1 P fra datamaterialet. Dette gir ubetydelig endring av årlige medianverdier]. I Skas-Heigre kanalen var det frem til 2008 tendens til økende fosforinnhold, men resultatene fra de siste to årene synes å bryte denne trenden. I Limavatnet og Edlandsvatnet synes forholdene å være relativt stabile, og algemengden (klorofyllinnholdet) var litt lavere mens fosforinnholdet var litt høyere enn ved forrige måling i 2006. Noe høyere algemengde i Limavatnet gjør at tilstanden her må vurderes som "Moderat", mens tilstanden i Edlandsvatnet må anses som "God".

I Mosvatnet i Orrevassdraget var det som ved tidligere målinger lavt innhold av alger, mens fosforinnholdet var økt noe. I Frøylandsvatnet har det de siste årene vært en tendens til økende fosforinnhold, men denne trenden ble brutt i 2010. Klorofyllinnholdet var også lavere enn de siste årene, og siktedypt (klarheten i vannet) var større. Ved utløpet av Orrevassdraget var fosforinnholdet lavere enn hva som har vært målt de siste årene, og nitrogeninnholdet kan synes å være avtakende.

I Håelva har fosforinnholdet vist en svak økning de siste årene, men var i 2010 litt lavere enn året før. Nitrogeninnholdet har derimot avtatt noe de siste par årene, men var igjen litt høyere i 2010. Samlet sett viser data fra 2004 og frem til i dag ingen klare utviklingstrenger for Håelva. [På tilsvarende måte, og med samme begrunnelse som for Figgjo (se ovenfor) er ekstremverdier utelatt fra datagrunnlaget for Håelva, men i 2010 var det ingen slike høye måleresultater]. I Tverråna var innholdet av næringsstoffer på nivå med tidligere år.

I småelvene var innholdet av næringsstoffer på nivå med det en har funnet de siste årene, og det er totalt sett få tegn til endringer siden målingene startet opp i 2004. En avtakende trend i nitrogeninnholdet som ble omtalt i fjorårets rapport ble de fleste stedene brutt ved høyere nitrogeninnhold i 2010.

I Ogna (som ble inkludert i prøvetakingen i 2009) har en ikke tilstrekkelig med data til å vurdere eventuelle utviklingstrenger, men som i nabovassdraget Fuglestadåna var fosforinnholdet lavt.

I Hålandsvatnet økte forekomster av blågrønnalgen *Planktothrix mougeotii* ytterligere i forhold til året før, som medførte at klorofyllinnholdet i innsjøen har vært raskt stigende de siste tre årene. Etter at denne blågrønnalgen første gang hadde en ekstrem oppvekst i 2005, indikerer resultatene at den har etablert seg i Hålandsvatnet med potensial for betydelig vekst. Biomassen økte igjen sent på høsten 2010 etter en topp i august (se datavedlegg), og utviklingen i 2011 bør følges nøye.

Totalt sett har det ikke vært klare tegn til endringer i innsjøene de siste årene, med unntak av utviklingen av *Planktothrix* i Hålandsvatnet (se ovenfor). I elvene har det heller ikke vært klare endringer siden målingene startet opp i 2004, og mye av svingingene en observerer fra år til år må antas å være forårsaket av underliggende naturgitte variasjoner (værforhold / nedbørsmønster og avrenning).

Et nytt klassifiseringssystem etter Vannforskriften er nå tatt i bruk (Direktoratsgruppa for vann-direktivet, Veileder 01:2009), og i figurer i vedlegget er resultater fremstilt i forhold til det nye klassifiseringssystemet. Nedenfor er de viktigste resultatene oppsummert.

Tabell 2 viser tilstand i innsjøer basert på nyere måleserier fra vannforekomstene. Som anbefalt i klassifiseringsveilederen er gjennomsnitt av resultater fra de siste 3 årene benyttet som grunnlag for klassifiseringen, for å utjewe naturgitte årlige variasjoner. Dette vil gi bedre grunnlag for fastsettelse av tilstandsklasse, så lenge det ikke har vært vesentlige endringer i de aktuelle innsjøene (slik tilfellet er her). Vanntyper er antatt med utgangspunkt i målinger av kalsium og farge, men en har for enkelte måttet gjøre antagelser om vanntype (basert på lokalisering og kjennskap til vannkvalitet i nærliggende vannforekomstene) der datagrunnlaget er mangelfullt eller hvor måleresultater ligger i grenseområder for innsjøtypifisering.

For alle innsjøene i tabell 2 er næringsstoffbelastning (eutrofierung) antatt som hovedpåvirkning. Det viktigste kvalitetselementet er da plantoplankton (her målt som klorofyll), og klassifiseringen er foretatt med utgangspunkt i klorofyllmålingene.

Etter klassifiseringssystemet skal relevante fysisk/kjemiske kvalitetselementer (her: total fosfor, siktedypt og oksygeninnhold i bunnvann) også vurderes, og dersom noen av disse indikerer dårligere tilstand enn biologiske kvalitetselementer (her: klorofyll) kan det medføre fastsettelse av en lavere (dårligere) tilstandsklasse. Men dette kan kun gjøres dersom tilstanden basert på biologiske kvalitetselementer er "svært god" eller "god", og kun medføre endring med en klasse (fra "svært god" til "god", eller fra "god" til "moderat"). Denne regelen har fått innvirkning for

Tabell 2. Tilstand i innsjøer etter nytt klassifiseringssystem (snitt for siste 3 år når slike data finnes). Beregnede normaliserte EQR-verdier, og tilhørende tilstandsklasser.

| Vannforekomst | Vanntype | Klorofyll | | Tot-P | | Tot-N | | Siktedyp | | Tilstandsklasse totalt | |
|---------------------|----------|-----------|------|--------|------|--------|------|----------|------|------------------------|---------|
| | | Status | nEQR | Status | nEQR | Status | nEQR | Status | nEQR | | |
| Hålandsvatnet | L-N1 | 3 | D | 0,31 | D | 0,34 | SD | 0,20 | M | 0,53 | Dårlig |
| Seldalsvatnet | (L-N1) | 14 | SG | 0,86 | SG | 0,81 | D | 0,34 | SG | 0,87 | God |
| Dybingen | L-N8a | 4 | G | 0,62 | M | 0,49 | D | 0,31 | G | 0,77 | Moderat |
| Kyllesvatnet | L-N1 | 3 | D | 0,38 | M | 0,52 | D | 0,22 | G | 0,75 | Dårlig |
| Lutsivatnet | L-N1 | 3 | G | 0,66 | G | 0,76 | D | 0,28 | SG | 0,85 | God |
| Bråsteinvatnet | L-N1 | 3 | M | 0,58 | G | 0,73 | SD | 0,16 | SG | 0,85 | Moderat |
| Stokkelandsvatnet | L-N1 | 3 | M | 0,51 | M | 0,54 | SD | 0,20 | G | 0,66 | Moderat |
| Oltedalsvatnet | L-N2a | 1 | SG | 0,85 | SG | 0,90 | G | 0,62 | SG | 0,84 | God? |
| Limavatnet | L-N2a | 1 | M | 0,53 | G | 0,69 | D | 0,23 | G | 0,73 | Moderat |
| Edlandsvatnet | L-N2a | 1 | G | 0,69 | SG | 0,84 | D | 0,34 | SG | 0,85 | God |
| Harvelandsvatnet | L-N8a | 4 | D | 0,29 | SD | 0,18 | SD | 0,19 | M | 0,44 | Dårlig |
| Fjermestadvatnet | L-N1 | 3 | SG | 0,83 | SG | 0,89 | D | 0,34 | SG | 0,98 | God |
| Mosvatnet (Time) | L-N3a | 3 | G | 0,75 | SG | 0,81 | G | 0,77 | SG | 0,84 | God |
| Frøylandsvatnet Sør | L-N1 | 3 | D | 0,26 | D | 0,28 | D | 0,27 | M | 0,50 | Dårlig |
| Horpestadvatnet | L-N1 | 3 | D | 0,21 | D | 0,25 | SD | 0,16 | M | 0,47 | Dårlig |
| Orrevatnet | L-N1 | 8 | D | 0,21 | D | 0,22 | D | 0,27 | M | 0,41 | Dårlig |
| Storamos | L-N6 | 13 | D | 0,28 | D | 0,21 | M | 0,49 | M | 0,51 | Dårlig |
| Taksdalsvatnet | L-N2a | 1 | M | 0,41 | D | 0,35 | D | 0,36 | M | 0,51 | Moderat |

Seldalsvatnet og Dybingen i Ims-Lutsi vassdraget, og for Fjermestadvatnet i Orrevassdraget. Nitrogen er i denne sammenhengen ikke like aktuelt å ta med i vurderingene, siden det vanligvis ikke har samme betydning som fosfor for algeveksten. Men høyt nitrogeninnhold også i de mindre belastede lokalitetene, som følge av betydelig atmosfærisk nitrogennedfall, ville etter de samme reglene medføre at Lutsivatnet og Edlandsvatnet i tabell 2 ville falle i klassen "Moderat". Også hydromorfologiske forhold kan medføre lavere tilstandsklasse (men da bare endring fra "svært god" til "god"), som er tilfellet for Oltedalsvatnet på grunn av reguleringshøyden der. Men her er neppe eutrofiering en vesentlig påvirkning, og tilstanden i tabell 2 er derfor angitt med spørsmålstege så lenge data om fisk eller andre relevante kvalitetselement mangler.

I elvene må begroingsalger regnes som det mest relevant biologisk kvalitetselement for virkningstypen eutrofiering (som er hovedpåvirkningen for de aktuelle elvene og bekkene i overvåningsprogrammet), men det er foreløpig ikke fastsatt klassegrenser for denne virknings-typen i det nye klassifiseringssystemet. Vurderingen for begroingsalger er derfor basert på det tidligere SFT-systemet i henhold til fremstillingene i tabell 1.

Det finnes riktig nok et foreløpig system (PIT-indeks) med klassegrenser for begroingsalger (Suzanne Schneider, NIVA; notat september 2009) som er benyttet i enkelte næringsstoffbelastede elver andre steder i Norge, men dette systemet er ikke tilfredsstillende for eutrofe elver slik det foreligger i dag (Suzanne Schneider; pers. medd.). Et nytt system er derfor nå under utarbeidelse. Som nevnt ovenfor ble undersøkelser etter dette nye systemet utført i et utvalg lokaliteter i 2010, og resultatene er vist i tabell 3 (som PIT-indeks, men uten tilstandsangivelse). Tabellen viser også resultater fra bunndyrsundersøkelsen i 2010, samt gjennomsnittsverdier for de siste 3 årene for total fosfor og total nitrogen i elvene der dette måles. Vanntyper er også her antatt med utgangspunkt i målinger av kalsium og farge, og der en ikke har slike data er det som for innsjøene gjort antagelser om vanntype basert på lokalisering og kjennskap til vannkvalitet i nærliggende vannforekomster. Det bemerkes at det er usikkerhet knyttet til enkelte av vanntype-vurderingene, og datagrunnlaget for dette bør generelt styrkes både for elvene og innsjøene.

I tabell 3 er ikke "total tilstandsklasse" for elvene angitt, siden en foreløpig mangler tilstrekkelig klassifiseringsgrunnlag for biologiske kvalitetselementer. Endelig tilstandsklassifisering må baseres på slike. Tilstanden for bunndyr angitt i tabellen bør derfor tillegges størst vekt.

Tabell 3. Antatt tilstand i elver (snitt for siste 3 år når slike data finnes). Beregnede normaliserte EQR-verdier, og tilhørende tilstandsklasser.

| Vannforekomst | Vanntype | Begroing | Bunndyr | | Tot-P | | Tot-N | |
|---------------------|----------|----------|---------|------|--------------|------|--------------|------|
| | | PIT | Status | nEQR | Status | nEQR | Status | nEQR |
| Svilandsåna | 3 | | God | 0,70 | | | | |
| Storåna | 3 | 20,5 | Dårlig | 0,26 | Moderat | 0,41 | Svært dårlig | 0,15 |
| Figgjo v/Auestad | 1 | | God | 0,61 | God | 0,75 | Dårlig | 0,39 |
| Gjesdalbekken | 1 | | God | 0,76 | Svært god | 0,85 | Svært dårlig | 0,17 |
| Straumåna | 1 | | Moderat | 0,53 | | | | |
| Figgjo inn Grudavtn | 3 | | Moderat | 0,59 | | | | |
| Skas-Heigre | 4 | 30,0 | | | Svært dårlig | 0,13 | Svært dårlig | 0,07 |
| Figgjo v/Bore | 3 | 17,4 | | | Moderat | 0,54 | Svært dårlig | 0,18 |
| Frøylandsåna | 4 | 19,1 | Moderat | 0,46 | Dårlig | 0,21 | Svært dårlig | 0,16 |
| Timebekken | 4 | | | | Svært dårlig | 0,11 | Svært dårlig | 0,04 |
| Orre utløp | 3 | | Dårlig | 0,31 | Dårlig | 0,25 | Svært dårlig | 0,17 |
| Tverråna | 4 | 25,5 | | | Dårlig | 0,25 | Svært dårlig | 0,12 |
| Håelva utløp | 4 | 19,2 | | | Moderat | 0,46 | Svært dårlig | 0,16 |
| Salteåna | 4 | 37,3 | | | Svært dårlig | 0,12 | Svært dårlig | 0,07 |
| Nordre Varhaugselv | 4 | 30,0 | | | Dårlig | 0,24 | Svært dårlig | 0,12 |
| Søndre Varhaugselv | 4 | 18,9 | | | Dårlig | 0,21 | Svært dårlig | 0,11 |
| Årslandsåna | 4 | 24,5 | | | Svært dårlig | 0,19 | Svært dårlig | 0,07 |
| Kvassheimåna | 4 | 18,9 | | | God | 0,68 | Svært dårlig | 0,12 |
| Fuglestadåna | 1 | 7,8 | | | God | 0,76 | Dårlig | 0,29 |
| Ogna v/Hølland bru | 1 | | | | Svært god | 0,87 | Dårlig | 0,40 |

Vanntyper: 1 = RN2, 3 = RN1+RN4

Referanse:

Molværmyr, Å. & M.A. Bergan 2011. Overvåking av Jærvassdrag 2010 – Datarapport. International Research Institute of Stavanger, rapport IRIS - 2011/052.

FIGURER OG DATA

På de følgende sidene i denne datarapporten presenteres overvåkingsresultatene i form av figurer og tabeller:

Figurer: tilstand og utvikling i innsjøene

Figurer: tilstand og utvikling i elver og bekker

Tabeller: temperatur og oksygen i innsjøene i 2010

Figurer: temperatur og oksygen i innsjøene i 2010

Tabeller: analyser og feltmålinger i innsjøene i 2010

Tabeller: planteplankton i innsjøene i 2010

Figurer: algebiomasse i innsjøene i 2010

Tabeller: algetoksiner målt i 2010

Tabeller: dyreplankton i innsjøene i 2010

Figurer: dyreplankton i innsjøene i 2010









Figurer: målinger i innsjøene i 2010

Tabeller og figurer: målinger i elver og bekker i 2010

Tabeller: begroingsalger i elver og bekker i 2010

Tabeller og figurer: bekker og elver overvåket i kommunal regi

Ims-Lutsi



Blå markering: Utløpsbekk
Andre: Innsjøprøver



■ To måleresultater

— Maksimum



✚ Middelverdi

— Minimum




Storåna





1992, 2004 og 2008: Innsjøprøver
Andre år: Utløpsbekk (fosformålinger)





Oltedal





Figgjovassdraget



2004, 2006 og 2010: Normale innsjøprøver
1997-01: Ved land (badevann)



2004, 2006 og 2010: Normale innsjøprøver
1997-01: Ved land (badevann)







Tilstandsklasser

| |
|--------------|
| Svært dårlig |
| Dårlig |
| Moderat |
| God |
| Svært god |

Maksimum
Middelverdi
Minimum

Orrevassdraget (1)









Tilstandsklasser

| |
|--------------|
| Svært dårlig |
| Dårlig |
| Moderat |
| God |
| Svært god |

↑ Maksimum
+ Middelverdi
↓ Minimum





Orrevassdraget (2)



| Tilstandsklasser | |
|------------------|--|
| Svært dårlig | |
| Dårlig | |
| Moderat | |
| God | |
| Svært god | |




Maksimum
Middelverdi
Minimum

Håelva






2004, 2005 og 2009: Innsjøprøver
Andre år: Utløpsbekk

Hålandsvatnet



Storåna




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 52 | 41 | 82 | 51 | 38 | 40 | 33 | | 1,64 | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 1,60 | 1,62 | 1,72 |
| Max | 95 | 70 | 381 | 177 | 69 | 79 | 49 | | 1,83 | 4,27 | 3,43 | 2,58 | 1,96 | 3,17 | 2,70 |
| Min | 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 20 | 15 | | 1,45 | 1,64 | 1,73 | 1,69 | 1,34 | 1,10 | 1,30 |
| Median | 42 | 38 | 41 | 41 | 36 | 36 | 35 | | 1,61 | 1,76 | 1,86 | 2,00 | 1,56 | 1,40 | 1,70 |
| Antall | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 |



Figgjo v/Auestad




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | | | | | 15 | 9 | |
| Max | | | | | 54 | 14 | |
| Min | | | | | 6 | 5 | |
| Median | | | | | 9 | 9 | |
| Antall | | | | | 8 | 7 | |

| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | | | | | 0,57 | 0,62 |
| | | | | | | 0,66 | 0,81 |
| | | | | | | 0,40 | 0,36 |
| | | | | | | 0,60 | 0,65 |
| | | | | | | 8 | 7 |



Gjesdalbekken v/Gjesdal kirke




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | | | | | | 9 | 10 | | | | | | | 1,09 | 1,33 |
| Max | | | | | | 13 | 15 | | | | | | | 1,40 | 1,60 |
| Min | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | 0,52 | 1,00 |
| Median | | | | | | 10 | 9 | | | | | | | 1,10 | 1,40 |
| Antall | | | | | | 8 | 7 | | | | | | | 7 | 7 |



Skas-Heigre kanalen

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 128 | 138 | 151 | 144 | 190 | 139 | 141 |
| Max | 254 | 326 | 283 | 200 | 430 | 389 | 310 |
| Min | 44 | 61 | 84 | 79 | 86 | 44 | 30 |
| Median | 121 | 121 | 135 | 134 | 150 | 107 | 100 |
| Antall | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |




| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 4,29 | 4,37 | 5,85 | 5,79 | 4,70 | 4,33 | 4,29 |
| | 6,44 | 7,36 | 10,80 | 8,99 | 6,73 | 5,39 | 7,60 |
| | 2,20 | 2,45 | 3,40 | 4,07 | 3,13 | 2,61 | 2,40 |
| | 4,31 | 4,16 | 5,38 | 5,65 | 4,66 | 4,49 | 4,10 |
| | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |



Figgjo v/Bore

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 33 | 22 | 20 | 22 | 28 | 20 | 26 |
| Max | 93 | 87 | 53 | 70 | 85 | 76 | 78 |
| Min | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Median | 26 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 22 |
| Antall | 47 | 52 | 51 | 50 | 46 | 52 | 39 |




| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 1,33 | 1,27 | 1,59 | 1,50 | 1,34 | 1,31 | 1,41 |
| | 1,77 | 1,85 | 3,63 | 2,08 | 2,19 | 2,44 | 3,80 |
| | 0,84 | 0,75 | 0,74 | 0,95 | 0,77 | 0,70 | 0,93 |
| | 1,36 | 1,28 | 1,54 | 1,56 | 1,31 | 1,30 | 1,30 |
| | 47 | 52 | 51 | 50 | 44 | 52 | 39 |



Frøylandsåna

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 62 | 48 | 38 | 89 | 51 | 169 | 62 |
| Max | 120 | 129 | 63 | 274 | 87 | 715 | 240 |
| Min | 23 | 21 | 21 | 26 | 32 | 22 | 21 |
| Median | 53 | 37 | 37 | 49 | 49 | 46 | 31 |
| Antall | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |




| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 1,78 | 1,95 | 1,93 | 2,27 | 1,84 | 1,92 | 1,93 |
| | 2,20 | 2,95 | 2,23 | 3,23 | 2,48 | 5,30 | 3,60 |
| | 1,42 | 1,63 | 1,53 | 1,55 | 1,53 | 1,07 | 1,30 |
| | 1,74 | 1,81 | 1,98 | 2,26 | 1,71 | 1,60 | 1,75 |
| | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |



Timebekken




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 167 | 138 | 174 | 145 | 190 | 193 | 132 |
| Max | 310 | 290 | 650 | 220 | 620 | 1500 | 290 |
| Min | 67 | 29 | 57 | 52 | 72 | 40 | 34 |
| Median | 170 | 140 | 115 | 150 | 125 | 110 | 120 |
| Antall | 15 | 20 | 16 | 20 | 24 | 25 | 21 |

| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 5,79 | 5,56 | 7,20 | 7,32 | 6,58 | 6,81 | 6,85 |
| | 7,10 | 9,60 | 14,00 | 9,60 | 8,90 | 18,00 | 9,40 |
| | 4,90 | 1,70 | 3,60 | 5,80 | 4,80 | 5,30 | 5,30 |
| | 5,40 | 5,50 | 6,60 | 7,00 | 6,25 | 6,30 | 6,70 |
| | 13 | 19 | 16 | 20 | 24 | 25 | 21 |






Orre-elva v/utløp

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 59 | 67 | 65 | 116 | 70 | 70 | 43 | | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 2,02 | 1,63 | 1,34 | 1,22 |
| Max | 109 | 293 | 136 | 435 | 132 | 128 | 75 | | 2,08 | 3,36 | 2,91 | 3,48 | 2,82 | 2,15 | 2,24 |
| Min | 34 | 29 | 32 | 38 | 42 | 36 | 22 | | 0,68 | 0,62 | 0,21 | 0,76 | 0,66 | 0,68 | 0,42 |
| Median | 52 | 51 | 50 | 93 | 56 | 69 | 41 | | 1,52 | 1,22 | 1,54 | 1,91 | 1,55 | 1,14 | 1,21 |
| Antall | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |






Salteåna

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 289 | 151 | 127 | 108 | 211 | 143 | 138 | | 4,85 | 4,52 | 4,99 | 5,21 | 4,78 | 4,22 | 4,72 |
| Max | 874 | 317 | 317 | 150 | 944 | 302 | 390 | | 6,63 | 5,96 | 7,22 | 6,10 | 5,83 | 6,14 | 8,60 |
| Min | 59 | 64 | 56 | 67 | 38 | 49 | 51 | | 3,71 | 2,07 | 3,98 | 4,43 | 3,77 | 3,00 | 3,50 |
| Median | 150 | 139 | 91 | 107 | 137 | 139 | 110 | | 4,52 | 4,65 | 4,84 | 5,10 | 4,68 | 4,05 | 4,45 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |






Håelva: Tverråna

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 150 | 92 | 76 | 47 | 99 | 73 | 68 | | 2,30 | 2,57 | 2,65 | 3,09 | 2,31 | 2,19 | 2,77 |
| Max | 404 | 441 | 183 | 83 | 303 | 155 | 270 | | 3,15 | 3,84 | 3,66 | 3,91 | 4,20 | 3,10 | 4,40 |
| Min | 17 | 26 | 28 | 26 | 25 | 22 | 15 | | 1,91 | 1,72 | 2,00 | 2,39 | 1,40 | 1,69 | 1,90 |
| Median | 115 | 52 | 58 | 41 | 88 | 57 | 46 | | 2,13 | 2,58 | 2,62 | 3,09 | 2,08 | 2,04 | 2,65 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |



Håelva




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 47 | 42 | 36 | 37 | 39 | 48 | 39 | | 1,61 | 1,83 | 1,96 | 1,91 | 1,84 | 1,74 | 2,09 |
| Max | 100 | 94 | 87 | 78 | 89 | 96 | 100 | | 2,53 | 4,21 | 3,27 | 2,98 | 3,23 | 3,10 | 3,20 |
| Min | 18 | 22 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | | 1,16 | 1,18 | 1,28 | 1,18 | 1,22 | 0,99 | 1,10 |
| Median | 44 | 37 | 31 | 36 | 35 | 42 | 35 | | 1,56 | 1,76 | 1,96 | 1,84 | 1,70 | 1,70 | 1,95 |
| Antall | 49 | 45 | 50 | 44 | 35 | 50 | 41 | | 50 | 44 | 50 | 44 | 35 | 49 | 42 |



Nordre Varhaugselv

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 164 | 52 | 75 | 60 | 109 | 70 | 70 |
| Max | 404 | 81 | 185 | 100 | 331 | 121 | 180 |
| Min | 33 | 31 | 34 | 36 | 31 | 25 | 26 |
| Median | 120 | 45 | 70 | 56 | 92 | 71 | 56 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |




| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 3,12 | 2,28 | 2,02 | 2,56 | 2,41 | 2,15 | 2,77 |
| | 6,88 | 3,13 | 2,84 | 3,15 | 4,16 | 3,00 | 5,70 |
| | 1,61 | 1,50 | 1,14 | 1,59 | 1,02 | 1,20 | 0,99 |
| | 2,83 | 2,37 | 1,98 | 2,60 | 2,19 | 2,14 | 2,75 |
| | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |



Søndre Varhaugselv




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 246 | 83 | 87 | 53 | 120 | 84 | 79 |
| Max | 869 | 178 | 266 | 103 | 323 | 203 | 210 |
| Min | 24 | 23 | 38 | 33 | 35 | 26 | 20 |
| Median | 126 | 73 | 60 | 43 | 97 | 70 | 69 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |

| | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 3,21 | 2,91 | 2,41 | 2,76 | 2,79 | 2,58 | 3,04 |
| | 6,18 | 4,49 | 4,11 | 4,24 | 5,92 | 3,60 | 7,60 |
| | 1,42 | 1,33 | 1,54 | 1,84 | 1,71 | 1,24 | 0,74 |
| | 2,94 | 2,94 | 2,50 | 2,68 | 2,30 | 2,60 | 2,90 |
| | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |






Årslandsåna

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 205 | 79 | 134 | 125 | 127 | 85 | 97 | | 4,17 | 3,61 | 3,40 | 4,59 | 3,80 | 3,62 | 4,88 |
| Max | 664 | 229 | 282 | 479 | 382 | 153 | 220 | | 6,73 | 6,83 | 5,28 | 8,50 | 10,80 | 5,37 | 14,00 |
| Min | 27 | 37 | 74 | 29 | 50 | 32 | 48 | | 0,65 | 0,83 | 2,13 | 2,16 | 1,09 | 1,08 | 0,49 |
| Median | 121 | 67 | 116 | 67 | 92 | 89 | 82 | | 4,23 | 3,75 | 3,67 | 4,28 | 3,28 | 3,55 | 4,30 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |






Kvassheimsåna

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 102 | 17 | 17 | 15 | 30 | 19 | 25 | | 1,78 | 2,06 | 2,06 | 3,12 | 2,17 | 2,22 | 2,88 |
| Max | 572 | 33 | 57 | 28 | 77 | 34 | 70 | | 2,92 | 2,84 | 2,96 | 3,77 | 3,30 | 3,10 | 4,40 |
| Min | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | | 1,28 | 1,58 | 1,56 | 2,46 | 1,63 | 1,64 | 1,40 |
| Median | 27 | 14 | 10 | 13 | 22 | 14 | 20 | | 1,68 | 2,01 | 2,08 | 3,12 | 2,10 | 2,15 | 2,90 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |






Fuglestadåna




| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 26 | 11 | 11 | 29 | 13 | 13 | 9 | | 0,75 | 0,78 | 0,83 | 0,96 | 0,77 | 0,70 | 0,79 |
| Max | 92 | 18 | 22 | 107 | 37 | 36 | 29 | | 0,99 | 1,11 | 1,21 | 1,33 | 1,15 | 1,10 | 1,20 |
| Min | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,71 | 0,50 | 0,44 | 0,37 |
| Median | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,96 | 0,72 | 0,66 | 0,80 |
| Antall | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |






Ogna v/Hølland bru

| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | | | | | | 9 | 9 | | | | | | | 0,55 | 0,60 |
| Max | | | | | | 17 | 27 | | | | | | | 0,79 | 1,20 |
| Min | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 0,31 | 0,04 |
| Median | | | | | | 8 | 7 | | | | | | | 0,56 | 0,58 |
| Antall | | | | | | 6 | 12 | | | | | | | 6 | 12 |









Kvantitativt planteplankton 2010

| Fytoplankton (mg våtvekt/l) Blandprøve overflatetlag | HÅLANDSVATNET Id: 1554 | | | | | | Kast fra land |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Dato: | 27.mai | 23.jun | 21.jul | 26.aug | 23.sep | 13.okt | 13.nov |
| BLÅGRØNNALGER: | | | | | | | |
| <i>Anabaena flos-aquae</i> | | | | | | | |
| <i>Anabaena sp.</i> | 1,75 | 0,02 | 0,40 | | | | |
| <i>Anabaena spiroides</i> | | | | | | | |
| <i>Aphanizomenon flos-aquae</i> | | | | | | | |
| <i>Aphanothece clathrata</i> | | | | | | | |
| <i>Chroococcus</i> | | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria</i> sp. | | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria naegeliana</i> | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | | | |
| <i>Limnothrix</i> (smale tråder) | | | | | | | |
| <i>Merismopedia tenuissima</i> | | | | | | | |
| <i>Microcystis</i> | | | | | | | |
| <i>Planktothrix mougeotii</i> | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 6,40 | 25,00 |
| <i>Oscillatoria agardhii</i> | | | | | | | |
| <i>Synechococcus</i> | | | | | | | |
| Små kuler | | | | | | | |
| BLÅGRØNNALGER TOTALT | 13,81 | 4,08 | 10,44 | 14,01 | 8,00 | 6,40 | 25,00 |
| % Blågrønnalger: | 95,4 | 86,6 | 93,2 | 99,4 | 94,5 | 96,4 | 99,5 |
| KISELALGER: | | | | | | | |
| <i>Asterionella formosa</i> | | 0,00 | | | | | |
| <i>Cyclotella</i> ($d < 10\mu m$) | | | | | | | |
| <i>Cyclotella</i> ($d > 10\mu m$) | | | | | | | |
| <i>Diatoma elongatum</i> | | | | | | | |
| <i>Fragilaria crotonensis</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | | |
| <i>Melosira</i> sp. | | | | | | | |
| <i>Synedra cf. acus</i> | | | | | | | |
| <i>Tabellaria fenestrata</i> | | 0,00 | | | | | |
| KISELALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| % Kiselalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| FUREFLAGELLATER: | | | | | | | |
| <i>Ceratium hirundinella</i> | 0,45 | 0,15 | 0,37 | | | | |
| <i>Peridinium inconspicuum</i> | | | | | | | |
| <i>Gymnodinium</i> sp. | | | | | | | |
| FUREFLAGELLATER TOTALT | 0,45 | 0,15 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Fureflagellater: | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GRØNNALGER: | | | | | | | |
| <i>Chlorococcales</i> | | 0,01 | | | | | |
| <i>Desmidiales / Staurastrum</i> sp. | | | | 0,00 | | | |
| <i>Volvocales</i> | | | | | | | |
| GRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Grønnalger: | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GULLALGER: | | | | | | | |
| <i>Dinobryon</i> sp. | | | | | | | |
| <i>Mallomonas</i> sp. | | | | | | | |
| <i>Synura</i> sp. | | | | | | | |
| GULLGER TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Gullalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CRYPTOMONADER | | | | | | | |
| <i>Cryptomonas</i> | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,08 |
| Div. store flagellater | | | | | | | |
| CRYPTOMONADER TOTALT | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,08 |
| % Cryptomonader: | 0,2 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 0,3 |
| ANDRE ALGER: | | | | | | | |
| Uspes. μ -alger | 0,19 | 0,35 | 0,33 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,05 |
| ANDRE TOTALT | 0,19 | 0,35 | 0,33 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,05 |
| % Andre alger: | 1,3 | 7,4 | 2,9 | 0,4 | 2,8 | 3,6 | 0,2 |
| TOTAL BIOMASSE (mg/l) | 14,48 | 4,71 | 11,20 | 14,09 | 8,47 | 6,64 | 25,13 |

Kvantitativt planteplankton 2010

| Fytoplankton (mg våtvekt/l) Blandprøve overflatelag | EDLANDSVATNET Id: 1546 | | | | | | LIMAVATNET Id: 1547 | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Dato: | 26.mai | 21.jun | 20.jul | 24.aug | 21.sep | 12.okt | | 26.mai | 21.jun | 20.jul | 24.aug | 21.sep | 12.okt |
| BLÅGRØNNALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anabaena flos-aquae</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anabaena</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anabaena spiroides</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aphanizomenon flos-aquae</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aphaniothece clathrata</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Chroococcus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria naegelianiana</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>G. naegelianiana solitare</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Merismopedia tenuissima</i> | | | | | | 0,01 | | | | | | | |
| <i>Microcystis</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Planktothrix mougeotii</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oscillatoria agardhii</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Synechococcus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Små kuler | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,20 | 0,04 |
| BLÅGRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,04 |
| % Blågrønnalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 44,4 | 8,9 |
| KISELALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Asterionella formosa</i> | 0,50 | | | | 0,02 | | | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Cyclotella (d< 10µm)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cyclotella (d> 10µm)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diatoma elongatum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fragilaria crotonensis</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Melosira</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Synedra cf. acus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tabellaria fenestrata</i> | | | | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | | 0,00 | | |
| KISELALGER TOTALT | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Kiselalger: | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUREFLAGELLATER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ceratium hirundinella</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Peridinium inconspicuum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gymnodinium</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| FUREFLAGELLATER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Fureflagellater: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GRØNNALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Chlorococcales</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Desmidiales / Staurastrum</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Volvocales</i> | | | | | | | | | | | | | |
| GRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Grønnalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GULLALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dinobryon divergens</i> | 0,14 | 0,00 | | 0,02 | | | 0,08 | | | | | | |
| <i>Mallomonas</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Synura</i> sp. | | | | | | | | | | | | | |
| GULLGER TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Gullalger: | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CRYPTOMONADER | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cryptomonas</i> | | | | | | | 0,02 | 0,08 | 0,04 | | 0,01 | 0,03 | |
| Div. store flagellater | 0,06 | | | | 0,06 | 0,01 | | | | | | | |
| CRYPTOMONADER TOTALT | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | |
| % Cryptomonader: | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2,6 | 0,6 | 17,4 | 12,1 | 0,0 | 2,2 | 6,7 | |
| ANDRE ALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| Uspes. µ-alger | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,38 | 0,86 | 0,38 | 0,29 | 0,12 | 0,24 | 0,38 | |
| ANDRE TOTALT | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,38 | 0,86 | 0,38 | 0,29 | 0,12 | 0,24 | 0,38 | |
| % Andre alger: | 27,1 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 47,5 | 97,4 | 25,6 | 82,6 | 87,9 | 75,0 | 53,3 | 84,4 | |
| TOTAL BIOMASSE (mg/l) | 0,96 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,40 | 0,39 | 3,36 | 0,46 | 0,33 | 0,16 | 0,45 | 0,45 | |

Kvantitativt planteplankton 2010






| Fytoplankton (mg våtvekt/l) Blandprøve overflatelag | MOSVATNET (Time) Id: 20038 | | | | | | FRØYLANDSVATNET - SØR Id: 1552 | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | Dato: | 28.mai | 22.jun | 21.jul | 25.aug | 22.sep | 13.okt | | 27.mai | 23.jun | 22.jul | 26.aug | 23.sep |
| BLÅGRØNNALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anabaena flos-aquae</i> | | | | | | | | 0,25 | 0,01 | 0,50 | 0,05 | 0,12 | |
| <i>Anabaena sp.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anabaena spiroides</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aphanizomenon flos-aquae</i> | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,00 | |
| <i>Aphanothece sp. (små celler i koloni)</i> | 0,25 | 0,20 | | | | | | | | | | | |
| <i>Chroococcus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria lacustris</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria naegeliana</i> | | | | | | | | 0,10 | 2,50 | 0,75 | 0,80 | 0,25 | 1,00 |
| <i>G. naegeliana</i> solitære | | | | | | | | | | | 0,24 | 0,01 | 1,00 |
| <i>Merismopedia tenuissima</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Microcystis</i> | | | | | | | | | | | 0,02 | | |
| <i>Planktothrix mougeotii</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oscillatoria agardhii</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Synechococcus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Små kuler</i> | | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | | | | | | | |
| BLÅGRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,29 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | | 0,35 | 2,51 | 1,25 | 1,12 | 0,38 | 2,00 |
| % Blågrønnalger: | 0,0 | 55,8 | 62,2 | 15,6 | 15,8 | 6,3 | | 11,9 | 71,9 | 81,2 | 26,3 | 39,2 | 81,6 |
| KISELALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Asterionella formosa</i> | | | | | | | 0,01 | 0,42 | | | 0,00 | | |
| <i>Cyclotella (d< 10µm)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cyclotella (d> 10µm)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diatoma elongatum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fragilaria sp.</i> | | | | | | | 0,00 | 0,35 | | | | | |
| <i>Melosira sp.</i> | | | | | | | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,40 | 0,20 | |
| <i>Synedra cf. acus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tabellaria fenestrata/flocculosa</i> | | | | | | | | | | | | | |
| KISELALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,54 | 0,35 | 0,06 | 0,08 | 0,40 | 0,20 | |
| % Kiselalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 18,3 | 10,0 | 3,9 | 1,9 | 41,2 | 8,2 | |
| FUREFLAGELLATER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ceratium hirundinella</i> | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,81 | | | |
| <i>Peridinium inconspicuum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gymnodinium sp.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| FUREFLAGELLATER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | |
| % Fureflagellater: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | |
| GRØNNALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Chlorococcales</i> | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | | | | | | | |
| <i>Desmidiales / Staurastrum sp.</i> | | | | | 0,02 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | |
| <i>Volvocales</i> | | | | | | | | | | | | | |
| GRØNNALGER TOTALT | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| % Grønnalger: | 6,7 | 5,8 | 0,0 | 6,3 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| GULLALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dinobryon sp.</i> | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| <i>Mallomonas sp.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Synura sp.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| GULLGER TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % Gullalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| CRYPTOMONADER | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cryptomonas</i> | | | | | | | 1,44 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| Div. store flagellater | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | | | | | | | |
| CRYPTOMONADER TOTALT | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,44 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| % Cryptomonader: | 26,7 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 48,8 | 1,4 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| ANDRE ALGER: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Uspes. µ-alger</i> | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,14 | 0,19 | 0,62 | 0,58 | 0,14 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | |
| ANDRE TOTALT | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,14 | 0,19 | 0,62 | 0,58 | 0,14 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | |
| % Andre alger: | 66,7 | 26,9 | 37,8 | 78,1 | 73,7 | 29,7 | 21,0 | 16,6 | 9,1 | 5,6 | 19,6 | 8,2 | |
| TOTAL BIOMASSE (mg/l) | 0,15 | 0,52 | 0,37 | 0,32 | 0,19 | 0,64 | 2,95 | 3,49 | 1,54 | 4,26 | 0,97 | 2,45 | |

Kvantitativt plantoplankton 2010



| Fytoplankton (mg våtvekt/l) Blandprøve overflatelag | STOKKELANDSVATNET Id: 19777 | | | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dato: | 28.mai | 22.jun | 21.jul | 25.aug | 22.sep | 13.okt |
| BLÅGRØNNALGER: | | | | | | |
| <i>Anabaena flos-aquae</i> | | | | | | |
| <i>Anabaena</i> sp. | | | | | | |
| <i>Anabaena spiroides</i> | | | | | | |
| <i>Aphanizomenon flos-aquae</i> | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,80 | 2,80 | |
| <i>Aphanothece clathrata</i> | | | | | | |
| Små celler i koloni | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria</i> cf. <i>lacustris</i> | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria naegeliana</i> | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | | |
| <i>G. naegeliana</i> solitære | | | | | | |
| <i>Merismopedia tenuissima</i> | | | | | | |
| <i>Microcystis</i> | | | | | | |
| <i>Planktothrix mougeotii</i> | | | | | | |
| <i>Oscillatoria agardhii</i> | | | | | | |
| <i>Synechococcus</i> | | | | | | |
| Små kuler | | | | 1,00 | | |
| BLÅGRØNNALGER TOTALT | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 1,84 | 2,86 | 0,00 |
| % Blågrønnalger: | 1,4 | 2,5 | 19,1 | 62,4 | 58,2 | 0,0 |
| KISELALGER: | | | | | | |
| <i>Asterionella formosa</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,16 | |
| <i>Cyclotella</i> ($d < 10\mu m$) | | | | | | |
| <i>Cyclotella</i> ($d > 10\mu m$) | | | | | | |
| <i>Diatoma</i> sp. | | | | | | |
| <i>Fragilaria crotonensis</i> | | | | | | |
| <i>Melosira</i> sp. | | | | | | |
| <i>Synedra</i> cf. <i>acus</i> | | | | | | |
| <i>Tabellaria fenestrata/flocculosa</i> | 0,45 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 1,20 | 0,04 |
| KISELALGER TOTALT | 0,45 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 1,36 | 0,04 |
| % Kiselalger: | 62,5 | 49,4 | 0,0 | 0,3 | 27,7 | 3,4 |
| FUREFLAGELLATER: | | | | | | |
| <i>Ceratium hirundinella</i> | | 0,15 | 0,36 | | | |
| <i>Peridinium inconspicuum</i> | | | | | | |
| <i>Gymnodinium</i> sp. | | | | | | |
| FUREFLAGELLATER TOTALT | 0,00 | 0,15 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Fureflagellater: | 0,0 | 18,5 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GRØNNALGER: | | | | | | |
| <i>Chlorococcales</i> | | | | | | |
| <i>Desmidiales / Staurastrum</i> sp. | | | | | | |
| <i>Volvocales</i> | | | | | | |
| GRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Grønnalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GULLALGER: | | | | | | |
| <i>Dinobryon divergens</i> | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | | |
| <i>Mallomonas</i> sp. | | | | | | |
| <i>Synura</i> sp. | | | | | 0,32 | |
| GULLGER TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Gullalger: | 20,8 | 6,2 | 13,5 | 4,7 | 0,0 | 27,1 |
| CRYPTOMONADER | | | | | | |
| <i>Cryptomonas</i> | | | | | | |
| Div. store flagellater | | | | | 0,21 | 0,10 |
| CRYPTOMONADER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,10 |
| % Cryptomonader: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 8,5 |
| ANDRE ALGER: | | | | | | |
| Uspes. μ -alger | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,96 | 0,48 | 0,72 |
| ANDRE TOTALT | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,96 | 0,48 | 0,72 |
| % Andre alger: | 15,3 | 23,5 | 27,0 | 32,5 | 9,8 | 61,0 |
| TOTAL BIOMASSE (mg/l) | 0,72 | 0,81 | 0,89 | 2,95 | 4,91 | 1,18 |

Kvantitativt planterplankton 2010

| Fytoplankton (mg våtvekt/l) Blandprøve overflatelag | OLTEDALSVATNET Id: 1659 | | | | | |
|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dato: | 26.mai | 21.jun | 20.jul | 24.aug | 21.sep | 12.okt |
| BLÅGRØNNALGER: | | | | | | |
| <i>Anabaena flos-aquae</i> | | | | | | |
| <i>Anabaena</i> sp. | | | | | | |
| <i>Anabaena spiroides</i> | | | | | | |
| <i>Aphanizomenon flos-aquae</i> | | | | | | |
| <i>Aphanothece clathrata</i> | | | | | | |
| Små celler i koloni | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria</i> cf. <i>lacustris</i> | | | | | | |
| <i>Gomphosphaeria naegeliana</i> | | | | | | |
| <i>G. naegeliana</i> solitære | | | | | | |
| <i>Merismopedia tenuissima</i> | | | | | | |
| <i>Microcystis</i> | | | | | | |
| <i>Planktothrix mougeotii</i> | | | | | | |
| <i>Oscillatoria agardhii</i> | | | | | | |
| <i>Synechococcus</i> | | | | | | |
| Små kuler | | | | | | |
| BLÅGRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Blågrønnalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KISELALGER: | | | | | | |
| <i>Asterionella formosa</i> | | | | | | |
| <i>Cyclotella</i> ($d < 10\mu m$) | | | | | | |
| <i>Cyclotella</i> ($d > 10\mu m$) | | | | | | |
| <i>Diatoma</i> sp. | | | | | | |
| <i>Fragilaria crotonensis</i> | | | | | | |
| <i>Melosira</i> sp. | | | | | | |
| <i>Synedra</i> cf. <i>acus</i> | | | | | | |
| <i>Tabellaria fenestrata</i> | | | | | | |
| KISELALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Kiselalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUREFLAGELLATER: | | | | | | |
| <i>Ceratium hirundinella</i> | | | | | | |
| <i>Peridinium inconspicuum</i> | | | | | | |
| Små dinoflagellater | | | | | | |
| FUREFLAGELLATER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Fureflagellater: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GRØNNALGER: | | | | | | |
| <i>Chlorococcales</i> | | | | | | |
| <i>Desmidiales / Staurastrum</i> sp. | | | | | | |
| <i>Volvocales</i> | | | | | | |
| GRØNNALGER TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Grønnalger: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GULLALGER: | | | | | | |
| <i>Dinobryon divergens</i> | | | | | | |
| <i>Mallomonas</i> sp. | | | | | | |
| <i>Synura</i> sp. | | | | | | |
| GULLGER TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Gullalger: | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 65,5 | 0,0 | 0,0 |
| CRYPTOMONADER | | | | | | |
| <i>Cryptomonas</i> | | | | | | |
| Div. store flagellater | 0,01 | 0,00 | | | 0,00 | 0,01 |
| CRYPTOMONADER TOTALT | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| % Cryptomonader: | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| ANDRE ALGER: | | | | | | |
| Uspes. μ -alger | | | | | | |
| ANDRE TOTALT | 0,34 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,14 |
| % Andre alger: | 97,1 | 100,0 | 81,0 | 34,5 | 100,0 | 93,3 |
| TOTAL BIOMASSE (mg/l) | 0,35 | 0,14 | 0,21 | 0,55 | 0,24 | 0,15 |

**Plantep plankton 2010**

- Blågrønnalger
- Andre alger



ALGETOKSINER I HÅLANDVATNET 2010:

| Dato | Microcystin µg/l | Dominerende algetype | Prøvetype |
|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 27.mai.2010 | 5,0 | Planktothrix | 0-6 meter ved hovedstasjon |
| 8.jun.2010 | 17,5 | Planktothrix | ca. 10 meter fra land, vest ved badeplass, 0-0,5 meter dyp |
| 23.jun.2010 | 23,0 | Planktothrix | 0-4 meter ved hovedstasjon |
| 6.jul.2010 | 20,5 | Planktothrix | ca. 10 meter fra land, vest ved badeplass, 0-0,5 meter dyp |
| 21.jul.2010 | 41,2 | Planktothrix | 0-4 meter ved hovedstasjon |
| 9.aug.2010 | 17,3 | Planktothrix | ca. 10 meter fra land, vest ved badeplass, 0-0,5 meter dyp |
| 26.aug.2010 | 15,0 | Planktothrix | 0-4 meter ved hovedstasjon |
| 9.sep.2010 | > 50 | Planktothrix | ca. 10 meter fra land, vest ved badeplass, 0-0,5 meter dyp |
| 23.sep.2010 | 26,6 | Planktothrix | 0-4 meter ved hovedstasjon |
| 12.okt.2010 | 27,0 | Planktothrix | 0-4 meter ved hovedstasjon |
| 30.nov.2010 | 30,0 | Planktothrix | ca. 10 meter fra land, vest ved badeplass, 0-0,5 meter dyp |

Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | HÅLANDSVATNET 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 27.mai | 23.jun | 21.jul | 26.aug | 23.sep | 13.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-10m | 0-10m | 0-4m | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 4,8 | 13,5 | 72,1 | 8,4 | 0,4 | 1,6 |
| herav: Nauplier | 0,8 | 10,8 | 51,4 | 3,2 | | 1,2 |
| Copepoditter | 3,2 | 2,4 | 15,5 | 4,4 | 0,4 | |
| Adulte | 0,8 | 0,4 | 5,2 | 0,8 | | 0,4 |
| <i>Cyclops sp.</i> | 0,8 | | 1,2 | 0,4 | | |
| Copepoditter | 0,8 | | 1,2 | 0,4 | | |
| Adulte | | | | | | |
| <i>Cyclopoide nauplier</i> | 1,2 | 2,4 | 20,7 | 2,0 | | 0,8 |
| Sum COPEPODER | 6,8 | 15,9 | 94,0 | 10,8 | 0,4 | 2,4 |
| <i>Daphnia galeata</i> | | 2,4 | 67,3 | 25,9 | 17,9 | 0,4 |
| Adulte hanner | | | 0,8 | | 0,4 | |
| Adulet hunner | | 2,4 | 66,5 | 25,9 | 17,5 | 0,4 |
| herav m/egg | | 0,0 | 7,6 | 0,8 | 1,2 | 0,0 |
| <i>Bosmina longirostris</i> | | | | 2,8 | 2,4 | 5,2 |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | | | | 2,8 | 2,4 | 5,2 |
| herav m/egg | | | | 0,8 | 2,0 | 2,4 |
| Sum CLADOCERER | 0,0 | 2,4 | 67,3 | 28,7 | 20,3 | 5,6 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 1,6 | | | 0,4 | | |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 197,6 | 113,1 | 292,0 | 79,3 | 40,6 | 11,6 |
| <i>Keratella quadrata</i> | 131,5 | 267,7 | 448,2 | 69,7 | 20,3 | 7,2 |
| <i>Brachionus sp.</i> | | | | | | |
| <i>Filinia cf. longisetata</i> | 1,2 | 27,1 | 3,6 | 1,6 | 47,4 | 87,6 |
| <i>Euchlanis dilatata</i> | | | | | | |
| <i>Polyarthra spp.</i> | 4,8 | 15,1 | 40,6 | 4,8 | 20,3 | 0,4 |
| <i>Synchaeta spp.</i> | 0,8 | 6,0 | 6,8 | 0,4 | | 0,8 |
| <i>Conochilus unicornis/hippocrepis</i> | | 21,9 | 27,1 | 7,2 | 0,8 | |
| <i>Asplanchna priodonta</i> | | 5,2 | 231,1 | 22,7 | 27,1 | |
| <i>Trichocerca sp.</i> | | | 0,8 | | 0,4 | |
| <i>Trichocerca sp.</i> | | | 0,8 | | 0,4 | |
| Sum ROTATORIER | 337,5 | 456,2 | 1051,0 | 186,1 | 157,4 | 107,6 |
| ZOOPLANKTON totalt | 344,2 | 474,5 | 1212,4 | 225,5 | 178,1 | 115,5 |
| % Copepoder | 2,0 | 3,4 | 7,8 | 4,8 | 0,2 | 2,1 |
| % Cladocerer | 0,0 | 0,5 | 5,6 | 12,7 | 11,4 | 4,8 |
| % Rotatorier | 98,0 | 96,1 | 86,7 | 82,5 | 88,4 | 93,1 |

Chaoborus flavicans LARVER

0,8

Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | STOKKELANDSVATNET 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 28.mai | 22.jun | 21.jul | 25.aug | 22.sep | 13.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-6m | 0-10m | 0-10m | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 16,7 | 13,1 | 29,5 | 21,1 | 10,8 | 1,6 |
| herav: Nauplier | 8,0 | 3,6 | 19,5 | 15,9 | 6,0 | 0,8 |
| Copepoditter | 7,2 | 6,4 | 7,6 | 3,6 | 4,0 | 0,8 |
| Adulte | 1,6 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | |
| <i>Mesocyclops leuckarti</i> | | 0,4 | 0,8 | 0,4 | | |
| Copepoditter | | | 0,8 | 0,4 | | |
| Adulte | | 0,4 | | | | |
| <i>Cyclops abyssorum</i> | 0,8 | 0,8 | | | | |
| Copepoditter | 0,4 | 0,8 | | | | |
| Adulte | 0,4 | | | | | |
| <i>Cyclopoida nauplier</i> | 17,9 | 4,4 | 9,6 | 2,8 | 4,0 | 1,6 |
| Sum COPEPODER | 35,5 | 18,7 | 39,8 | 24,3 | 14,7 | 3,2 |
| <i>Daphnia galeata</i> | 32,3 | 17,1 | 6,4 | 2,4 | 4,4 | 0,4 |
| Adulte hanner | 0,4 | | | | 0,4 | |
| Adulet hunner | 31,9 | 17,1 | 6,4 | 2,4 | 4,0 | 0,4 |
| herav m/egg | 5,2 | 1,2 | 3,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Bosmina longirostris</i> | 6,0 | | 0,4 | | 0,4 | 0,8 |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 6,0 | | 0,4 | | 0,4 | 0,8 |
| herav m/egg | 0,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,8 |
| <i>Leptodora kindthii</i> | | 0,4 | | | | |
| Sum CLADOCERER | 38,2 | 17,5 | 6,8 | 2,4 | 4,8 | 1,2 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 28,7 | 15,1 | 11,2 | 3,6 | 2,0 | 2,0 |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 220,3 | 26,7 | 19,1 | 8,0 | 89,2 | 9,6 |
| <i>Polyarthra spp.</i> | 9,2 | 4,8 | 43,8 | | 4,4 | 0,8 |
| <i>Synchaeta spp.</i> | 5,6 | | 4,4 | 0,4 | 1,6 | |
| <i>Conochilus unicornis/hippocrepis</i> | 4,8 | 6,8 | 8,8 | | | 0,4 |
| <i>Asplanchna priodonta</i> | 3,6 | 0,8 | | | 0,4 | 2,0 |
| <i>Ploesoma hudsoni</i> | | | | 0,4 | | |
| <i>Ubetemte arter</i> | | | | 3,2 | 1,2 | |
| Sum ROTATORIER | 290,0 | 66,9 | 206,8 | 16,7 | 100,4 | 14,7 |
| ZOOPLANKTON totalt | 363,7 | 103,2 | 253,4 | 43,4 | 119,9 | 19,1 |
| % Copepoder | 9,7 | 18,1 | 15,7 | 56,0 | 12,3 | 16,7 |
| % Cladocerer | 10,5 | 17,0 | 2,7 | 5,5 | 4,0 | 6,3 |
| % Rotatorier | 79,7 | 64,9 | 81,6 | 38,5 | 83,7 | 77,1 |

Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | OLTEDALSVATNET 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 26.mai | 21.jun | 20.jul | 24.aug | 21.sep | 12.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-10m | 0-14m | 0-12m | 0-14m | 0-14m | 0-14m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 5,6 | 6,4 | 10,1 | 3,9 | 4,9 | 4,7 |
| herav: Nauplier | 1,7 | 3,9 | 4,7 | 2,1 | 1,9 | 0,9 |
| Copepoditter | 3,6 | 1,9 | 4,1 | 0,9 | 2,4 | 2,6 |
| Adulte | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,1 |
| <i>Cyclops scutifer</i> | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Copepoditter | 0,6 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Adulte | 0,4 | 0,6 | 0,2 | | | |
| <i>Cyclopoide copepoditter</i> | | | | | 0,2 | |
| <i>Cyclopoide nauplier</i> | 0,2 | 1,5 | 2,8 | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
| Sum COPEPODER | 6,7 | 8,4 | 13,1 | 4,9 | 6,4 | 5,2 |
| <i>Daphnia galeata</i> | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 2,8 | 2,2 | 2,4 |
| Adulte hanner | | | | | 0,4 | 0,4 |
| Adulet hunner | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 2,8 | 1,9 | 2,1 |
| herav m/egg | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| <i>Bosmina longispina</i> | 2,6 | 3,2 | | | 8,0 | 27,3 |
| Adulte hanner | | | | | 8,0 | 27,3 |
| Adulet hunner | 2,6 | 3,2 | | | 0,6 | 1,3 |
| herav m/egg | 0,7 | 0,6 | | | | |
| <i>Diaphanosoma brachyurum</i> | | | 6,4 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
| Adulte hanner | | | | | 6,4 | 0,4 |
| Adulet hunner | | | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
| herav m/egg | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Holopedium gibberum</i> | 0,4 | 0,6 | | | | |
| Adulet hunner | 0,4 | 0,6 | | | | |
| herav m/egg | 0,2 | 0,2 | | | | |
| <i>Leptodora kindthii</i> | | 0,4 | 0,4 | | | |
| <i>Bythotrephes longimanus</i> | | | 0,2 | | | |
| Sum CLADOCERER | 3,2 | 4,9 | 7,7 | 3,9 | 11,2 | 30,1 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 13,1 | 22,8 | 38,9 | 1,7 | 1,5 | 0,7 |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 3,9 | 0,7 | 7,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| <i>Polyarthra spp.</i> | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| <i>Synchaeta spp.</i> | 0,6 | 0,2 | | | | |
| <i>Conochilus unicornis/hippocrepis</i> | 2,8 | 6,4 | 0,2 | | 0,9 | |
| <i>Asplanchna priodonta</i> | 0,2 | | | | | |
| <i>Ploesoma hudsoni</i> | | 0,4 | | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| <i>Ubetemte arter</i> | | 0,4 | | 0,4 | 0,2 | |
| Sum ROTATORIER | 22,4 | 32,3 | 48,8 | 2,8 | 3,9 | 1,7 |
| ZOOPLANKTON totalt | 32,3 | 45,6 | 69,5 | 11,6 | 21,5 | 37,0 |
| % Copepoder | 20,8 | 18,4 | 18,8 | 41,9 | 29,6 | 14,1 |
| % Cladocerer | 9,8 | 10,7 | 11,0 | 33,9 | 52,2 | 81,3 |
| % Rotatorier | 69,4 | 70,9 | 70,2 | 24,2 | 18,3 | 4,5 |

Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | LIMAVATNET 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 26.mai | 21.jun | 20.jul | 24.aug | 21.sep | 12.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-10m | 0-12m | 0-10m | 0-12m | 0-12m | 0-14m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 4,7 | 2,1 | 6,4 | 5,6 | 13,3 | 3,9 |
| herav: Nauplier | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 2,6 | 4,3 | 0,7 |
| Copepoditter | 4,1 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 7,7 | 1,7 |
| Adulte | 0,2 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| <i>Heterocope saliens</i> | | 0,4 | 0,4 | | | |
| Copepoditter | | | | | | |
| Adulte | | 0,4 | 0,4 | | | |
| <i>Cyclops scutifer</i> | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 8,0 |
| Copepoditter | 1,1 | 0,2 | | 0,7 | 0,9 | 8,0 |
| Adulte | 1,3 | 0,4 | 0,2 | | | |
| <i>Eucyclops macruroides</i> | | | | 0,2 | | |
| Copepoditter | | | | | | |
| Adulte | | | | 0,2 | | |
| <i>Cyclopoidae nauplier</i> | 9,5 | 19,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
| Sum COPEPODER | 16,6 | 22,1 | 7,9 | 7,7 | 15,3 | 12,3 |
| <i>Daphnia galeata</i> | 4,1 | 5,6 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 2,8 |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 4,1 | 5,6 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 2,8 |
| herav m/egg | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,2 |
| <i>Bosmina longispina</i> | 0,2 | | | | 0,2 | |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 0,2 | | | | 0,2 | |
| herav m/egg | 0,0 | | | | 0,0 | |
| <i>Bosmina coregoni</i> | 5,2 | 1,7 | 0,6 | 7,9 | 6,5 | 0,6 |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 5,2 | 1,7 | 0,6 | 7,9 | 6,5 | 0,6 |
| herav m/egg | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 2,2 | 3,4 | 0,0 |
| <i>Diaphanosoma brachyurum</i> | | | 0,9 | 0,4 | 0,6 | |
| Adulte hanner | | | | 0,2 | | |
| Adulet hunner | | | 0,9 | 0,2 | 0,6 | |
| herav m/egg | | | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |
| <i>Bythotrephes longimanus</i> | | | | | 0,2 | |
| Sum CLADOCERER | 9,5 | 7,3 | 2,8 | 9,0 | 8,8 | 3,4 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 48,4 | 24,7 | 9,7 | 2,8 | 17,0 | 7,5 |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 30,1 | 3,2 | 0,9 | 0,4 | 25,0 | 22,8 |
| <i>Keratella quadrata</i> | | | | | | |
| <i>Filinia cf. longiseta</i> | 0,6 | | | | | |
| <i>Euchlanis dilatata</i> | | | 0,2 | | | |
| <i>Polyarthra spp.</i> | | 0,2 | | 0,4 | 3,6 | 0,6 |
| <i>Synchaeta spp.</i> | | | | 0,2 | | |
| <i>Conochilus unicornis/hippocrepis</i> | 5,4 | 2,1 | 5,4 | 5,4 | 2,2 | 0,4 |
| <i>Asplanchna priodonta</i> | 33,8 | 0,2 | | 0,9 | 0,9 | |
| <i>Trichocerca sp.</i> | 0,2 | | | | | |
| <i>Ploesoma hudsoni</i> | | | | 0,2 | 0,2 | |
| <i>Lecane sp.</i> | | | | | | 0,2 |
| Sum ROTATORIER | 118,5 | 30,3 | 16,3 | 10,3 | 49,0 | 31,4 |
| ZOOPLANKTON totalt | 144,7 | 59,6 | 26,9 | 26,9 | 73,1 | 47,1 |
| % Copepoder | 11,5 | 37,0 | 29,2 | 28,5 | 21,0 | 26,2 |
| % Cladocerer | 6,6 | 12,2 | 10,4 | 33,3 | 12,0 | 7,1 |
| % Rotatorier | 81,9 | 50,8 | 60,4 | 38,2 | 67,0 | 66,7 |

Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | EDLANDSVATNET 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 26.mai | 21.jun | 20.jul | 24.aug | 21.sep | 12.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-12m | 0-12m | 0-12m | 0-12m | 0-12m | 0-14m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 5,0 | 2,1 | 3,6 | 7,9 | 5,4 | 2,6 |
| herav: Nauplier | 0,6 | 0,9 | 2,6 | 5,6 | 3,2 | 0,7 |
| Copepoditter | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 1,5 |
| Adulte | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| <i>Heterocope saliens</i> | 1,9 | 0,2 | 0,2 | | | |
| Copepoditter | 1,9 | | | | | |
| Adulte | | 0,2 | 0,2 | | | |
| <i>Cyclops scutifer</i> | 1,9 | 0,4 | | 0,2 | 0,4 | 3,6 |
| Copepoditter | 0,6 | 0,4 | | 0,2 | 0,4 | 3,6 |
| Adulte | 1,3 | | | | | |
| <i>Cyclopoide nauplier</i> | 2,1 | 3,0 | | 0,9 | 2,1 | 1,5 |
| Sum COPEPODER | 10,8 | 5,6 | 3,7 | 9,0 | 7,9 | 7,7 |
| <i>Daphnia galeata</i> | 2,2 | 4,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 2,2 | 4,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| herav m/egg | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Bosmina coregoni</i> | 15,0 | 7,9 | 0,4 | 6,2 | 4,1 | 1,7 |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 15,0 | 7,9 | 0,4 | 6,2 | 4,1 | 1,7 |
| herav m/egg | 5,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 1,7 | 0,7 |
| <i>Ceriodaphnia pulchella</i> | 0,2 | | | | | |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 0,2 | | | | | |
| herav m/egg | 0,2 | | | | | |
| <i>Diaphanosoma brachyurum</i> | | | 0,2 | 4,5 | 0,2 | |
| Adulet hunner | | | 0,2 | 4,5 | 0,2 | |
| herav m/egg | | | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| <i>Holopedium gibberum</i> | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | | |
| Adulet hunner | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | | |
| herav m/egg | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | | |
| Sum CLADOCERER | 19,8 | 13,8 | 1,7 | 12,3 | 5,0 | 2,8 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 26,5 | 14,4 | 4,7 | 1,1 | 6,4 | 6,5 |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 11,8 | 0,6 | | 3,9 | 5,8 | 27,9 |
| <i>Polyarthra spp.</i> | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 3,9 | 3,9 | 1,3 |
| <i>Synchaeta spp.</i> | | | | | 0,2 | |
| <i>Conochilus unicornis/hippocrepis</i> | | 7,9 | 24,1 | 0,7 | 2,2 | |
| <i>Asplanchna priodonta</i> | 4,7 | | | | 0,4 | 0,9 |
| <i>Ploesoma hudsoni</i> | 0,6 | | | 3,0 | 0,9 | |
| <i>Ubetemte arter</i> | | | 3,0 | 3,2 | | 0,4 |
| Sum ROTATORIER | 45,4 | 23,2 | 32,1 | 15,9 | 19,8 | 37,0 |
| ZOOPLANKTON totalt | 76,1 | 42,6 | 37,6 | 37,2 | 32,7 | 47,5 |
| % Copepoder | 14,3 | 13,2 | 10,0 | 24,1 | 24,0 | 16,1 |
| % Cladocerer | 26,0 | 32,5 | 4,5 | 33,2 | 15,4 | 5,9 |
| % Rotatorier | 59,7 | 54,4 | 85,6 | 42,7 | 60,6 | 78,0 |


Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | FRØYLANDSVATNET SØR 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 27.mai | 23.jun | 22.jul | 26.aug | 23.sep | 14.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-12m | 0-10m | 0-10m | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 39,4 | 97,6 | 78,1 | 17,9 | 25,5 | 6,8 |
| herav: Nauplier | 21,1 | 13,1 | 32,3 | 4,0 | 10,8 | 3,6 |
| Copepoditter | 15,1 | 65,3 | 30,7 | 10,0 | 13,1 | 2,4 |
| Adulte | 3,2 | 19,1 | 15,1 | 4,0 | 1,6 | 0,8 |
| <i>Cyclops strenuus/abyssorum</i> | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 0,4 |
| Copepoditter | 2,8 | | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 0,4 |
| Adulte | 0,4 | | 0,4 | | | |
| <i>Mesocyclops leucarti</i> | | 2,0 | 22,3 | 4,4 | 0,8 | |
| Copepoditter | | 0,4 | 20,7 | 4,0 | 0,8 | |
| Adulte | | 1,6 | 1,6 | 0,4 | | |
| <i>Cyclopoidae nauplier</i> | 3,2 | 7,2 | 3,2 | 17,1 | 1,6 | 0,8 |
| Sum COPEPODER | 45,8 | 107,2 | 106,4 | 41,4 | 28,3 | 8,0 |
| <i>Daphnia galeata</i> | 6,0 | 6,8 | 1,2 | 0,8 | 9,2 | 4,4 |
| Adulte hanner | | | | | 0,4 | |
| Adulet hunner | 6,0 | 6,8 | 1,2 | 0,8 | 8,8 | 4,4 |
| herav m/egg | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,0 |
| <i>Daphnia cristata</i> | | | 2,4 | 5,6 | 29,5 | 17,9 |
| Adulte hanner | | | | | 1,2 | |
| Adulet hunner | | | 2,4 | 5,6 | 29,5 | 16,7 |
| herav m/egg | | | 0,0 | 0,4 | 6,4 | 0,4 |
| <i>Bosmina longirostris</i> | 2,4 | | | | 0,4 | 0,8 |
| Adulte hanner | | | | | 0,4 | 0,8 |
| Adulet hunner | 2,4 | | | | 0,0 | 0,4 |
| herav m/egg | 0,4 | | | | | |
| <i>Leptodora kindthii</i> | | 0,4 | 0,8 | | | |
| <i>Chydorus cf. sphaericus</i> | | | 0,8 | | | |
| Sum CLADOCERER | 8,4 | 7,2 | 5,2 | 6,4 | 39,0 | 23,1 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 0,8 | 2,8 | 4,8 | | | |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 272,9 | 10,4 | 32,7 | 14,3 | 22,7 | 1,6 |
| <i>Keratella quadrata</i> | 151,0 | 10,8 | 43,4 | | 1,2 | 3,6 |
| <i>Filinia cf. longisetosa</i> | 11,2 | | 0,8 | | | 2,0 |
| <i>Trichocerca sp.</i> | | | | | 2,0 | 0,4 |
| Sum ROTATORIER | 435,9 | 23,9 | 81,7 | 14,3 | 25,9 | 7,6 |
| ZOOPLANKTON totalt | 490,0 | 138,2 | 193,2 | 62,2 | 93,2 | 38,6 |
| % Copepoder | 9,3 | 77,5 | 55,1 | 66,7 | 30,3 | 20,6 |
| % Cladocerer | 1,7 | 5,2 | 2,7 | 10,3 | 41,9 | 59,8 |
| % Rotatorier | 88,9 | 17,3 | 42,3 | 23,1 | 27,8 | 19,6 |


Kvantitativt dyreplankton

| Innsjø: Zooplankton (individer/L), 90 µm | MOSVATNET (Time) 2010 Blandprøve fra overflaten til angitt dyp | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Prøvetakingsnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dato: | 28.mai | 22.jun | 21.jul | 25.aug | 22.sep | 13.okt |
| Prøvetakingsdyp: | 0-12m | 0-10m | 0-10m | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
| <i>Eudiaptomus gracilis</i> | 11,0 | 20,0 | 32,9 | 15,9 | 17,9 | 7,9 |
| herav: Nauplier | 3,2 | 4,7 | 19,4 | 4,3 | 7,3 | 0,2 |
| Copepoditter | 7,1 | 2,6 | 9,0 | 8,2 | 8,6 | 5,0 |
| Adulte | 0,7 | 12,7 | 4,5 | 3,4 | 2,1 | 2,6 |
| <i>Heterocope saliens</i> | 0,7 | 0,7 | 1,7 | | | |
| Copepoditter | 0,7 | | | | | |
| Adulte | | 0,7 | 1,7 | | | |
| <i>Cyclops abyssorum</i> | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| Copepoditter | 0,6 | 0,6 | | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| Adulte | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | | 0,6 |
| <i>Cyclops scutifer</i> | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 5,4 | 2,2 |
| Copepoditter | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 5,0 | 1,9 |
| Adulte | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| <i>Cyclopoide copepoditter</i> | | | | | | |
| <i>Cyclopoide nauplier</i> | 7,3 | 10,5 | 2,1 | 15,1 | 8,4 | 18,3 |
| Sum COPEPODER | 21,7 | 35,0 | 38,3 | 33,5 | 32,0 | 29,5 |
| <i>Daphnia galeata</i> | 9,2 | 2,6 | 0,2 | 0,7 | 12,0 | 5,0 |
| Adulte hanner | | | | | 0,7 | |
| Adulet hunner | 9,2 | 2,6 | 0,2 | 0,7 | 11,2 | 5,0 |
| herav m/egg | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,2 |
| <i>Ceriodaphnia cf. pulchella</i> | 0,4 | | | 0,2 | | |
| Adulte hanner | | | | | | |
| Adulet hunner | 0,4 | | | 0,2 | | |
| herav m/egg | 0,0 | | | 0,0 | | |
| <i>Bosmina coregoni</i> | | 0,2 | | 0,9 | 15,3 | 3,4 |
| Adulte hanner | | | | | 0,2 | |
| Adulet hunner | | 0,2 | | 0,9 | 15,3 | 3,2 |
| herav m/egg | | 0,0 | | 0,2 | 4,9 | 1,5 |
| <i>Diaphanosoma brachyurum</i> | | | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
| Adulte hanner | | | | 0,2 | | |
| Adulet hunner | | | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| herav m/egg | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| <i>Holopedium gibberum</i> | 2,4 | | | | 0,2 | |
| Adulet hunner | 2,4 | | | | 0,2 | |
| herav m/egg | 0,4 | | | | 0,0 | |
| <i>Leptodora kindthii</i> | 0,2 | | | | | |
| <i>Acroperus harpae</i> | | | | 0,2 | | |
| Sum CLADOCERER | 12,1 | 2,8 | 0,4 | 3,0 | 27,9 | 8,6 |
| <i>Kellicottia longispina</i> | 113,1 | 9,9 | 13,5 | 48,4 | 71,8 | 33,8 |
| <i>Keratella cochlearis</i> | 30,3 | | | | 0,4 | 0,4 |
| <i>Polyarthra spp.</i> | 0,2 | | 0,4 | 1,1 | 9,3 | 0,6 |
| <i>Pompholyx sulcata</i> | 0,7 | | 3,0 | | | |
| <i>Conochilus unicornis/hippocrepis</i> | 3,6 | 48,4 | 27,5 | 0,9 | | 8,6 |
| <i>Asplanchna priodonta</i> | | | | | | 0,2 |
| <i>Ploesoma hudsoni</i> | | | | 0,4 | 0,6 | |
| Sum ROTATORIER | 147,9 | 58,3 | 44,3 | 50,8 | 82,1 | 43,6 |
| ZOOPLANKTON totalt | 181,7 | 96,1 | 83,0 | 87,3 | 141,9 | 81,7 |
| % Copepoder | 11,9 | 36,4 | 46,2 | 38,3 | 22,5 | 36,2 |
| % Cladocerer | 6,7 | 2,9 | 0,5 | 3,4 | 19,6 | 10,5 |
| % Rotatorier | 81,4 | 60,7 | 53,4 | 58,2 | 57,8 | 53,3 |


Maksimum dyretall 2010











Utvikling i Frøylandsvatnet










Årlig fangst av sik og lagesild







Innsjøer 2010: Beregnede normaliserte EQR-verdier

Elver 2010: Beregnede normaliserte EQR-verdier



BEGROINGSALGER 2010

| Vassdrag: | Ims | Storåna | Oltedal | Figgjo | Otre | Hå | Småelvene | Ogna |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------------|
| Stasjon: | Svinandsåna v/Kylliesv. | Ved Jermbanene | Oppstrøms Ragsjøenma | Innleip Grudavatn | Kvernbekken | Bore bru | Fryylandsåna | Ogna v/Hølland bru |
| Dato: | 10.09 | 08.09 | 10.09 | 10.09 | 09.09 | 09.09 | 08.09 | 07.09 |
| BLÅGRONNALGER: | | | | | | | | |
| Stigonenma | | | | | | | | |
| Cathartix | | | | | | | | |
| Diverse aliente BG | | | | | | | | |
| Oscillatoria limosa | 1 | | | | | | | |
| Trådformige BG (d<4um) | 1 | | | | | | | |
| Oscillatoria (d= 4-8 um) | 1 | | | | | | | |
| Biofilm smale tråder | 1 | | | | | | | |
| KISELAGER: | | | | | | | | |
| Eunotia | | | | | | | | |
| Tabellaria flocculosa | | | | | | | | |
| Achnanthidium minutissima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fragilaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Syndra spp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ceratoneis | | | | | | | | |
| Meridion circulare | | | | | | | | |
| Diatoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cocconeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cymbella spp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cymbella ventricosa | | | | | | | | |
| Pinnularia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gomphonema 1 (små) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gomphonema 2 (store) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Melosira varians | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| Syndra ulna | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Navicula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitzschia | | | | | | | 1 | 1 |
| Frustulia rhomboidea | | | | | | | 1 | 1 |
| ANDRE: | | | | | | | | |
| Batrachospermum | | | | | | | x | |
| Bulbochaete | | x | | | | | | x |
| Microspora etc. | | x | | | | | | x |
| Megeotria | x | | | | | | | x |
| Chiadophora (grønnalg) | x | | | | | | | x? |
| cf. Chaetophora sp. | x | | | | | | x | x |
| Oedogonium (grønnalg) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trådformede grønnalger | x | | x | x | x | x | | x |
| LITTE ALGER | | | | | | | | |
| KLASSE: | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 2 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 2 |

1: forekomst av en indikator i klassifiseringsssystemet
x: forekomst av andre typer organismer utenom klassifiseringsssystemet



Gjesdal: Bekker og elver overvåket i kommunal regi

| Prøver tatt i 2010 Lokalitet | Tot-P ($\mu\text{g P/l}$) | | | | Tot-N (mg NP/l) | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|-----------------|------|------|--------|
| | snitt | min | max | median | snitt | min | max | median |
| Inn Oltedalsvatnet | 11,8 | 4,7 | 30 | 6,6 | 0,45 | 1,33 | 0,62 | 0,76 |
| Gjesdalbekken v/Gjesdal | 9,7 | 5,1 | 15 | 8,7 | 0,36 | 1,00 | 0,36 | 0,35 |
| Figgjo v/Auestad | 8,9 | 5,4 | 14 | 8,7 | 0,53 | 1,60 | 0,81 | 0,92 |
| Figgjo v/Gautedal | 9,2 | 6,3 | 14 | 8 | 0,46 | 1,40 | 0,65 | 0,82 |

Total fosfor 2010**Total nitrogen 2010**



Randaberg: Bekker og elver overvåket i kommunal regi

| Prøver tatt i 2010 Lokalitet | Tot-P ($\mu\text{g P/l}$) | | | | Tot-N (mg NP/l) | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|------|--------|-----------------|------|-------|--------|
| | snitt | min | max | median | snitt | min | max | median |
| Bøkanalen Bø | 2233 | 97 | 6900 | 555 | 7,63 | 5,40 | 12,00 | 7,10 |
| Bøkanalen Harestad | 185 | 110 | 320 | 165 | 7,25 | 4,00 | 11,00 | 6,85 |

Total fosfor 2010**Total nitrogen 2010**

Hå: Bekker og elver overvåket i kommunal regi

| Prøver tatt i 2010 (mai - desember) Lokalitet | Tot-P ($\mu\text{g P/l}$) | | | | Tot-N (mg NP/l) | | | |
|--|-----------------------------|-----|-----|--------|-----------------|------|------|--------|
| | snitt | min | max | median | snitt | min | max | median |
| Kvermebekken | 37 | 15 | 63 | 31 | 3,66 | 2,00 | 5,10 | 4,00 |
| Sandvebekken, avkjøring v/Hadland | 106 | 22 | 230 | 120 | 3,96 | 2,40 | 5,30 | 4,20 |
| Bø-bekken | 11 | 4,7 | 21 | 10 | 2,37 | 1,40 | 3,00 | 2,60 |
| Bekk mellom Bø og Fuglestad | 22 | 12 | 34 | 19 | 2,31 | 1,30 | 4,10 | 2,30 |
| Hekk fra Herredselva (Moåna) | 15 | 11 | 29 | 14 | 1,45 | 0,58 | 2,10 | 1,50 |

Total fosfor 2010**Total nitrogen 2010**

Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi

| | Kanal 1 | | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 106 | 153 | 488 | 148 | 111 | 96 | 179 | 3,42 | 2,96 | 4,44 | 3,28 | 2,67 | 2,35 | 2,59 |
| Max | 156 | 212 | 2780 | 334 | 174 | 131 | 990 | 3,96 | 3,36 | 12,80 | 3,72 | 2,87 | 3,00 | 4,60 |
| Min | 75 | 76 | 64 | 64 | 77 | 51 | 32 | 2,90 | 2,11 | 1,75 | 2,80 | 2,08 | 1,30 | 1,90 |
| Median | 96 | 160 | 155 | 118 | 98 | 112 | 63 | 3,41 | 3,15 | 3,18 | 3,27 | 2,82 | 2,42 | 2,30 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 |

| | Kanal 2 | | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|-------|------|-------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 378 | 719 | 312 | 269 | 428 | 174 | 202 | 8,87 | 14,84 | 7,98 | 6,53 | 7,22 | 5,35 | 5,48 |
| Max | 979 | 3150 | 670 | 331 | 1120 | 443 | 540 | 19,90 | 62,30 | 22,80 | 8,07 | 12,60 | 6,33 | 8,70 |
| Min | 110 | 108 | 123 | 205 | 111 | 85 | 76 | 4,85 | 3,71 | 2,44 | 5,30 | 4,33 | 4,08 | 4,40 |
| Median | 211 | 254 | 272 | 269 | 228 | 110 | 140 | 5,36 | 5,78 | 6,47 | 6,49 | 6,60 | 5,53 | 5,00 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 |

| | Stangelandskanalen | | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 419 | 700 | 752 | 1207 | 360 | 200 | 297 | 6,07 | 7,84 | 9,73 | 9,03 | 6,91 | 4,49 | 4,73 |
| Max | 930 | 1860 | 1530 | 5200 | 959 | 446 | 920 | 10,10 | 15,60 | 21,90 | 21,70 | 18,30 | 7,43 | 9,50 |
| Min | 190 | 129 | 53 | 92 | 31 | 90 | 66 | 4,55 | 3,53 | 2,93 | 3,97 | 2,38 | 3,00 | 2,10 |
| Median | 278 | 509 | 898 | 398 | 257 | 190 | 225 | 4,82 | 6,98 | 9,64 | 6,26 | 4,81 | 4,13 | 4,00 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 |

| | Bekk 1 Hellestøstrand | | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 186 | 43 | 572 | 671 | 74 | 66 | 1426 | 3,36 | 2,76 | 4,89 | 4,53 | 2,76 | 2,55 | 6,43 |
| Max | 636 | 52 | 2490 | 2960 | 144 | 158 | 12000 | 4,69 | 4,30 | 7,15 | 8,35 | 4,04 | 3,83 | 33,00 |
| Min | 25 | 32 | 43 | 30 | 47 | 24 | 16 | 2,57 | 0,68 | 3,48 | 2,74 | 1,12 | 1,50 | 1,30 |
| Median | 42 | 45 | 85 | 133 | 64 | 66 | 120 | 3,09 | 3,04 | 4,58 | 3,39 | 2,99 | 2,41 | 2,80 |
| Antall | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 |

Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi

| | Bekk 2 Hellestøstranden | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 51 | 73 | 114 | 107 | 113 | 63 | 64 | 6,61 | 6,98 | 8,24 | 7,50 | 6,13 | 5,38 | 5,23 |
| Max | 88 | 105 | 234 | 274 | 343 | 109 | 170 | 9,01 | 8,03 | 10,10 | 12,20 | 8,54 | 7,39 | 7,40 |
| Min | 22 | 40 | 26 | 24 | 32 | 25 | 11 | 5,18 | 5,39 | 6,34 | 2,95 | 3,08 | 3,80 | 3,20 |
| Median | 48 | 72 | 106 | 60 | 64 | 67 | 30 | 6,12 | 7,48 | 7,99 | 7,53 | 6,30 | 4,69 | 5,20 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 |

| | Liseånå | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 112 | 169 | 60 | 125 | 83 | 91 | 115 | 4,64 | 3,77 | 3,24 | 5,79 | 4,43 | 3,74 | 3,63 |
| Max | 147 | 301 | 191 | 243 | 144 | 150 | 220 | 5,08 | 4,60 | 4,55 | 11,50 | 5,67 | 4,60 | 6,40 |
| Min | 77 | 40 | 31 | 62 | 49 | 52 | 42 | 3,47 | 2,27 | 2,26 | 3,15 | 3,48 | 2,38 | 1,50 |
| Median | 112 | 192 | 45 | 111 | 67 | 93 | 120 | 5,01 | 3,91 | 3,09 | 4,81 | 4,38 | 3,74 | 3,45 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 |

| | Sandbekken | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 342 | 308 | 511 | 445 | 927 | 587 | 425 | 5,26 | 4,58 | 5,40 | 5,69 | 5,13 | 4,18 | 4,33 |
| Max | 372 | 497 | 1710 | 668 | 1800 | 1710 | 1900 | 7,48 | 7,16 | 10,20 | 7,06 | 5,73 | 5,04 | 5,90 |
| Min | 296 | 226 | 150 | 275 | 376 | 291 | 110 | 3,44 | 2,72 | 2,74 | 4,87 | 3,86 | 3,41 | 3,50 |
| Median | 349 | 263 | 237 | 452 | 1010 | 481 | 300 | 5,07 | 4,39 | 4,71 | 5,31 | 5,28 | 4,16 | 4,00 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 |

| | Grannesbekken | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 88 | 135 | 51 | 69 | 56 | 42 | 70 | 2,93 | 2,93 | 2,22 | 3,33 | 2,61 | 2,46 | 2,84 |
| Max | 123 | 370 | 130 | 171 | 114 | 61 | 220 | 3,38 | 3,86 | 3,50 | 5,58 | 5,20 | 2,90 | 6,00 |
| Min | 41 | 51 | 26 | 26 | 27 | 23 | 20 | 2,53 | 1,78 | 1,31 | 2,30 | 1,21 | 1,70 | 1,80 |
| Median | 95 | 87 | 42 | 37 | 44 | 36 | 47 | 2,91 | 3,08 | 1,91 | 2,90 | 2,19 | 2,52 | 2,65 |
| Antall | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 |

Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi

| | Soldalsbekken | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 50 | 50 | 84 | 218 | 35 | 38 | 46 | 3,17 | 3,03 | 3,35 | 3,99 | 3,02 | 2,65 | 2,87 |
| Max | 70 | 80 | 197 | 809 | 60 | 57 | 110 | 3,73 | 4,49 | 4,92 | 5,24 | 4,13 | 3,60 | 4,50 |
| Min | 25 | 17 | 42 | 27 | 24 | 22 | 20 | 2,67 | 1,97 | 2,00 | 3,22 | 1,32 | 1,51 | 1,30 |
| Median | 53 | 52 | 59 | 81 | 31 | 33 | 34 | 3,15 | 2,69 | 3,04 | 3,89 | 3,22 | 2,60 | 2,85 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 |


| | Hestabekken | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 145 | 112 | 137 | 167 | 114 | 144 | 168 | 4,15 | 4,17 | 3,53 | 4,86 | 4,94 | 4,10 | 3,62 |
| Max | 205 | 248 | 262 | 337 | 146 | 240 | 590 | 4,84 | 5,32 | 5,26 | 6,05 | 7,49 | 4,91 | 5,50 |
| Min | 119 | 65 | 57 | 72 | 82 | 97 | 56 | 2,45 | 3,04 | 2,63 | 3,83 | 3,49 | 3,04 | 2,50 |
| Median | 128 | 78 | 122 | 130 | 117 | 110 | 89 | 4,65 | 4,10 | 3,35 | 4,95 | 4,76 | 4,09 | 3,50 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 |

| | Foruskanalen | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|-------|------|------|------|------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | 126 | 769 | 1710 | 81 | 112 | 68 | 41 | 2,55 | 4,81 | 11,28 | 3,01 | 3,70 | 2,40 | 2,31 |
| Max | 186 | 3700 | 13200 | 119 | 366 | 117 | 100 | 3,27 | 13,70 | 64,00 | 4,86 | 8,40 | 3,40 | 3,30 |
| Min | 69 | 95 | 43 | 58 | 38 | 42 | 18 | 1,78 | 2,56 | 1,75 | 1,99 | 1,65 | 1,74 | 0,94 |
| Median | 124 | 228 | 55 | 71 | 58 | 67 | 34 | 2,58 | 2,89 | 2,84 | 2,87 | 2,74 | 2,53 | 2,30 |
| Antall | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 |


| | Bekk, Ølberg | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Total fosfor ($\mu\text{g/l}$) | | | | | | | Total nitrogen (mg/l) | | | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Snitt | | | | | 139 | 263 | 144 | | | | | 3,93 | 3,81 | 3,52 |
| Max | | | | | 152 | 793 | 360 | | | | | 4,98 | 7,20 | 4,30 |
| Min | | | | | 129 | 84 | 49 | | | | | 2,73 | 2,43 | 2,50 |
| Median | | | | | 137 | 170 | 110 | | | | | 4,28 | 3,57 | 3,65 |
| Antall | | | | | 5 | 10 | 12 | | | | | 5 | 10 | 12 |

Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi


Kanal 1




Kanal 1




Kanal 2




Kanal 2




Stangelandskanalen



Stangelandskanalen




Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi




Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi


Sandbekken




Sandbekken




Grannesbekken




Grannesbekken









Soldalsbekken



Soldalsbekken



Sola: Bekker og elver overvåket i kommunal regi**Hestabekken****Hestabekken****Foruskanalen****Foruskanalen****Bekk, Ølberg****Bekk, Ølberg**

RAPPORT OM BUNNDYR OG FISK

Undersøkelser av bunndyr og fisk i utvalgte Jærvassdrag høsten 2010

Morten A. Bergan

NIVA

Sammendrag

Økologisk tilstand ved bruk av bunndyr som kvalitetselement er gjennomført på 8 utvalgte stasjoner i vannforekomster i vannområde Jæren. Undersøkelser på yngel-/ungfiskbestanden av laksefisk er i tillegg gjennomført på de samme lokalitetene. Resultatene fra fiskeundersøkelsene er vurdert i tråd med den nye vannforskriftens og vanndirektivets tilnærming til laksefisk som kvalitetselement for å klassifisere økologisk tilstand og miljøkvalitet i ferskvann.

Dataene viser at 3 av 8 bunndyrstasjoner (Svilandsåna, Figgjo ved Auestad og Gjesdalbekken) klassifiseres til god økologisk tilstand, noe som betyr at stasjonsområdets miljøkvalitet er innenfor den nye vannforskriftens miljømål på undersøkelsestidspunktet. 3 av 8 bunndyrstasjoner (Figgjo ved Grudavatn, Frøylandsåna og Straumåna) klassifiseres til moderat økologisk tilstand, med kun små avvik fra et forventet miljømål ihht vannforskriften.

Bunndyrfaunaen på stasjonene i Storåna og Orre ved utløp har en miljøkvalitet som har større avvik fra miljømålet på undersøkelsestidspunktet, og klassifiseres til å ha en dårlig økologisk tilstand.

Det er ikke foretatt en klassifisering av økologisk tilstand ved bruk av laksefisk som kvalitetselement på bakgrunn av undersøkelsen i 2010, da det foreløpig ikke eksisterer en nasjonal, standardisert tilnærming eller metodikk for dette. Resultatene fra undersøkelsen er imidlertid vurdert i tråd med et pågående arbeidet for å finne frem til nasjonale kriterier på dette feltet.

Yngel-ungfisk av laksefisk i Svilandsåna, Straumåna, Gjesdalbekken og Figgjo ved utløp Grudavatn vurderes å ha en tilstand som kan være tilfredsstillende i forhold til et framtidig miljømål for disse vannforekomstene etter ny vannforskrift. Storåna, Figgjo ved Auestad og Frøylandsåna vurderes å ha såpass stor reduksjon i bestanden av yngel-/ungfisk at tilstanden ikke er forenlig med et framtidig miljømål for disse vannforekomstene. Stasjonen nederst i Orrevassdraget har ikke naturlige, hydromorfologiske forutsetninger for å kunne foreta en vurdering av tilstanden til fiskesamfunnet i stasjonsområdet.

Fiskeundersøkelsen ble gjennomført på et noe ugunstig tidspunkt i forhold til kriteriene for bruk av laksefisk som kvalitetselement på miljøkvalitet og økologisk tilstand, da vannføringen var noe høy, vanntemperaturen lav og tidspunktet noe sent på året (medio november).

Erfaringsgrunnlaget for fiskesamfunn i vassdrag som omfattes av denne undersøkelsen bør økes i tiden som kommer, og fokus rettes opp mot miljømål angitt etter vanndirektivet og ny vannforskrift. Det betyr at vannforekomster som potensielt kan ha status som Sterkt Modifiserte Vannforekomster må avklares, og videre at fokus på forhold som kontinuitet og frie vandringsveier for laksefisk og ål må vies større oppmerksomhet i tillegg til vassdragets vannkvalitet.

Lokaliteter

Tabell 1. Oversikt over anvendt metodikk i det enkelte vassdrag og på hver stasjon

| <i>Jærenvassdrag</i> | | <i>Metodikk</i> | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Vassdrag</i> | <i>Stasjon</i> | <i>Bunndyr</i> | <i>Kvant. elfiske</i> | <i>Kval. elfiske</i> |
| Ims-Lutsi | Svilandsåna v/Sviland | x | x | x |
| Storåna | Ved jernbane | x | x | x |
| Figgjo | Ved Auestad | x | x | |
| Figgjo | Straumåna v/Straumheia | x | x | |
| Figgjo | Gjesdalbekken v/Gjesdal | x | x | |
| Figgjo | Ved innløp Grudavatn | x | x | |
| Orrevassdraget | Frøylandsåna | x | x | |
| Orrevassdraget | Ved utløp | x | | x |

Metodikk: Bunndyrundersøkelser

Metoden for innsamling av bunndyrmaterialet er gjort i henhold til Veileder 01: 2009: Klassifisering av miljøtilstand i vann (Iversen m.fl. 2009). Bunndyrprøvene er høstprøver innsamlet den 15 og 16. november i 2010, og er tatt med sparkemetoden (Frost et al. 1971). Metoden går ut på at en holder en firkantet håv (25 x 25 cm, maskevidde 250 µm) ned mot elvebunnen og sparker opp substratet ovenfor håven, slik at bunndyrene blir ført av vannstrømmen inn i håven (jf. NS4719 og NS-ISO 7828). Det er tatt 3 ett-minutts prøver (R1) på hver stasjon, tilsvarende ca 9 meter elvestrekning, fra fortrinnsvis hurtigrennende habitater med stein/grussubstrat. For hvert minutt med sparkling er håven tømt for å hindre tetting av maskene og tilbakespyling av materiale ut av håven. Hver sparkeprøve er fiksert med etanol i felt for videre bearbeidelse og taksonomisk bestemmelse ved NIVA's biologiske laboratorier.

Ulike grupper og arter av bunndyr har forskjellige toleransegrenser i forhold til forurensningsbelastning og annen påvirkning. I en ren elv eller bekk, som i liten grad avviker fra naturtilstanden med økologisk tilstand "God" eller bedre, vil man kunne forvente å finne en klar dominans av bunndyrgrupper som døgn-, stein- og vårflyer (i tillegg til andre rentvannsformer). Karakteristisk for slike lokaliteter vil være høy diversitet av arter, der følsomme taxa opptrer med tetthet større enn enkeltfunn, og der det er liten forskyving av dominansforhold mot tolerante arter. Et sterkt innslag av gravende og detritus-spisende bunndyrgrupper, som f.eks. børstemark, igler, snegler, midd, fjærmygg og andre tovinger som har høy toleranse ovenfor forurensning og påvirkning, vil derimot være indikatorer på forurensninger.

En vanlig tilnærming til biologisk mangfold i bekker og elver er en vurdering av forekomsten av ulike indikatortaxa i samfunnet av bunndyr. En mye brukt indeks her er det totale antall EPT– arter/taxa, som tar utgangspunkt i hvor mange arter av døgnflyer (E= Ephemeroptera), steinflyer (P= Plecoptera) og vårflyer (T= Trichoptera) en registrerer på lokaliteten. En reduksjon i antall EPT taxa i forhold til det en ville forvente var naturtilstanden danner grunnlaget for vurdering av graden av påvirkning. Naturtilstanden hos bunndyrafaunaen i våre vannforekomster varierer mye, og påvirkes både av vannforekomstens størrelse, biotopens utforming og beliggenhet (høyde over havet, nedbørfeltets geologi og geografisk beliggenhet), så systemet må brukes med forsiktighet.

I henhold til Veileder 01: 2009 ble ASPT indeksen (Armitage, 1983) i tillegg anvendt til vurdering av den økologiske tilstanden i bunndyrsamfunnet på våre høstprøver. Indeksen baserer seg på en rangering av et utvalg av de familiene som kan påtreffes i bunndyr-samfunnet i elver, og etter deres toleranse ovenfor organisk belastning/næringsaltanrikning. Toleranseverdiene varierer fra 1 til 10, der 1 angir høyest toleranse. ASPT indeksen gir en midlere toleranseverdi for bunndyrfamiliene i prøven. Målt indeksverdi skal vurderes i forhold til en referanseverdi for hver vanntype. Referanseverdien er satt til 6,9 for bunnfaunaen i elver. Denne referanseverdien skal per i dag gjelde for alle typer rennede vann ihht Klassifiseringsveilederens typifisering av vassdrag. For nærmere informasjon om vurderingssystemet henvises det til Veileder 01: 2009.

På hver stasjon er indeksene for antall EPT arter og ASPT-indekser anvendt for klassifisering av økologisk tilstand.

Metodikk: Yngel-/ungfiskundersøkelser av laksefisk

Vassdrag på Jæren og tilnærming til ny vannforskrift og vanndirektivet

Den nye vannforskriften vil implementere EUs vanndirektiv i norsk regelverk, og skal sikre en bærekraftig bruk av vassdrag og at nye, fastsatte miljømål nåes. Som nevnt ovenfor inngår fiskefaunaen som et av kvalitetselementene som skal overvåkes og klassifiseres, der bl.a. laksefisk vil bli en sentral indikator på om målet om tilstrekkelig gytte-/oppvekst, vandrings- og spredningsveier nås. Fokus på fremmede og innførte fiskearter vil dessuten øke. Tilstedeværelse av ål (*Anguilla anguilla*) og forvaltning av vassdrag med tanke på denne vil også øke i omfang i henhold til den nye vannforskriften, all den tid ål nå er oppført på den norske rødlisten (Kålås m.fl. 2010) og er i sterkt nedgang på verdensbasis.

De involverte kommunenes overvåkings- og forvaltningsplaner for vassdrag på Jæren (Vannområde Jæren) bør derfor tilnærmes vanndirektivet i tiden som kommer, slik at eventuelle tidligere miljømål og den nye vannforskriftens miljømål samordnes. Vanndirektivet fremmer tiltaksrettet overvåking og forvaltning av vassdrag, der det forpliktes å gjøre tiltak dersom miljømål ikke er oppfylt.

For fiskesamfunn i Vannområde Jæren betyr dette større fokus på dagens hydromorfologi koblet opp mot naturtilstand, en mer tiltaksrettet overvåking med identifisering av problempunkter i vassdraget, og større fokus på restaurerings- og biotopjusterende tiltak i sammenheng med vassdragskontinuitet for å nå fastsatte miljømål. Dette kommer i tillegg til den generelle organiske belastnings- og eutrofieringsproblematikken som erfares i mange av vassdragene på Jæren per i dag.

Vassdrag på Jæren berøres i sterkt grad av vanndirektivets nye, mer rettede, tiltaksorienterte fokus, der mange vassdrag har større eller mindre grad av antropogene, hydromorfologiske vassdragsinngrep og redusert vannkvalitet.

Vassdrag på Jæren og status som Sterkt Modifisert Vannforekomst

Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er definisjonen på vassdrag som er så påvirket av samfunnsnyttige fysiske inngrep at miljømålet ”god økologisk tilstand” ikke kan oppnås innenfor en samfunnsøkonomisk rimelighet. SMVF er imidlertid ikke et unntak for miljømål, men en egen kategori, der egendefinerte, tilpassede miljømål, som i større grad tar hensyn til inngrepet, vil gjelde. For SMVF vil miljømålet være ”godt økologisk potensiale”, eller GØP. Dette miljømålet vil slik NIVA tolker det i mange tilfeller settes lavere sammenlignet med ordinære vassdrag, og vil nødvendigvis måtte settes individuelt for hver enkelt vannforekomst. Det er viktig å understreke at det i tillegg til oppfylt GØP vil være krav om minst god kjemisk tilstand på linje med naturlige vannforekomster.

GØP er ikke et endelig definert miljømål. GØP er definert som tilstanden i en vannforekomst et gitt antall år etter at en kostnadsmessig akseptabel tiltakspakke er blitt gjennomført (Skarbøvik m.fl. 2006). Godt økologisk potensial beskrives i karakteriseringsveilederen (Syversen 2007) dessuten å være som den beste tilstanden en kan oppnå etter gjennomføring av alle relevante avbøtende tiltak, uten at en fjerner hensikten med det samfunnsnyttige inngrepet som ligger til grunn for SMVF-kategoriseringen. Karakteriseringsveilederens tabell 5.1 skisserer konkrete kriterier for å peke ut foreløpige sterkt modifiserte vannforekomster i ferskvann, herunder elver.

Videre kan en vannforekomst i følge Skarbøvik m.fl. 2006 utpekes som sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) når følgende vilkår er oppfylt:

- a) De endringer i vannforekomstens hydromorfologiske egenskaper som er nødvendige for å oppnå god økologisk tilstand har vesentlige innvirkninger på
 - (i) miljøet generelt
 - (ii) skipsfart, havneanlegg eller fritidsaktiviteter
 - (iii) aktiviteter som krever magasinering av vann, for eksempel drikkevannsforsyning, elektrisitetsproduksjon eller vanning
 - (iv) vassdragsregulering, flomvern, drenering eller
 - (v) annen tilsvarende viktig bærekraftig virksomhet
 og
- b) De samfunnsnyttige formålene den kunstige eller sterkt modifiserte vannforekomsten tjener, på grunn av manglende teknisk gjennomförbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke kan oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

Som følge av at flere vassdrag i vannområde Jæren kan være regulert til ulike formål eller ha store deler av sin vassdragslengde betydelig hydromorfologisk påvirket av jordbruk (kanalisering, utretting, m.m.) vurderer vi at det vil være viktig å ta stilling til dette framover.

Vi vil ikke gå nærmere inn på dette i denne rapporten, men vil anbefale at det tas stilling til dette ved vurderingen av resultatene i enkelte vannforekomster, der vi ser et behov for en avklaring av status og framtidig miljømål..

Felt- og innsamlingsmetodikk

Det er foretatt undersøkelser med el-fiskeapparat (GeOmega FA-4, Terik Technology) av yngel-/ungfiskbestanden på hver enkelt lokalitet den 15. og 16. november 2010. Elfisket er gjennomført etter standardisert metode (Jf. NS-EN 14011), det vil si tre gjentatte overfiskinger med et opphold på ca. 30 minutter mellom hver fiskeomgang (Bohlin m.fl. 1989). På alle stasjoner med kvantitatitt elfiske er det beregnet tetthet av yngel og ungfish etter Zippin (1958). Observerte fisk som ikke lot seg fange er inkludert i tetthetsestimatene. Observerte verdier er benyttet i de tilfeller resultatene ikke gir nok grunnlag eller forutsetninger for tetthetsberegninger etter Zippin.

Det er også foretatt kvalitative undersøkelser utenom stasjonsområdet (søk med elfiskeapparat) for å øke erfaringsgrunnlagt for fiskesamfunnet på noen av stasjonene. Resultatene fra dette er omtalt kvalitativt. På det nedre avsnittet av Orrevassdraget (Orre ved utløp) er det kun foretatt kvalitative undersøkelser. Stasjonsområdet vurderes som uegnet for kvantitative undersøkelser av yngel-/ungfisk som følge av ukurat naturlig hydromorfologi og substratsammensetning. Denne typen lokaliteter er vanskelige å vurdere i forhold til miljøkvalitet og eventuelle avvik fra naturtilstand, og i dette tilfellet er det også metodiske problemer i forhold til elfiske pga dybdeforholdene på stasjonen. Dette omtales nærmere under resultatvurderingene.

Samtlige fiskearter av laksefisk som ble fanget er registrert, i tillegg til evt. fangst av ål. Fisk fra hver omgang ble oppbevart levende i en bøtte til fisket på stasjonen var avsluttet. All fisk er lengdemålt fra snutespiss til naturlig utstrakt halefinne. For ål er ca lengdefordeling anslått, da lengdemåling av levende ål er komplisert. Etter lengdemåling er fiskene sluppet tilbake levende i vassdraget igjen. Lengdefrekvens-fordelingen i fiskematerialet danner grunnlaget for antatt aldersfordelingen, i kombinasjon med avlesing av ottolitter på enkeltindivider for å styrke aldersangivelsen. Laksefisk eldre enn 1 år er ikke differensiert i tetthetsvurderingene, og aldersgruppene er slått sammen til $\geq 1+$.

Vurdering av fiskesamfunnets tilstand

Sammensetning, mengde og alderstruktur for fiskefaunaen er angitt som et kvalitetselement for klassifisering av økologisk tilstand i rennende vann. Per i dag foreligger det ikke en nasjonal, standardisert metodikk eller vurderingsmåte for bruk av laksefisksamfunn som kvalitetselement på økologisk tilstand.

NIVA arbeider imidlertid med utvikling av tilnærningsmåter for å kunne bruke laksefisk som et kvalitetselement i mindre vassdrag (Bergan m.fl., i arbeid), der laksefisk er dominerende fiskegruppe. Dette arbeidet foreslår at vannforekomster skal vurderes ut fra den økologiske funksjonen de vil kunne ha for laksefisk ved en naturtilstand. Det betyr at hver enkelt vannforekomst tilegnes en funksjonskategori eller økologisk funksjon, som tar utgangspunkt i vassdragets naturlige forutsetninger for å holde og produsere laksefisk, som må oppfylles for at miljømål skal oppnås. Det vil bli utarbeidet forslag til klassegrenser i forhold til forventet tetthet og alderssammensetning av laksefisk (ørret og/eller laks) for å oppnå miljømål ihht vannforekomstens økologiske funksjon for fiskesamfunnet. I det foreløpige forslaget (Bergan m.fl. i arbeid) synliggjøres tre (hoved-) funksjonskategorier for mindre vassdrag basert på deres naturlige forutsetninger for å holde og produsere laksefisk; Funksjon velutviklet (-fiskesamfunn), gyte-/rekrutteringsfunksjon og oppholds-/refugiumfunksjon. Betydelige avvik på vannforekomstens økologiske funksjon i dag sammenlignet med opprinnelig naturtilstand vil dermed ikke være forenlig med miljømålet om God økologisk tilstand.

Alle vassdragene i denne undersøkelsen i Vannområde Jæren er vassdrag hvor det forventes å være veltuviklete fiskesamfunn i naturtilstand, med tilfredsstillende tettheter av flere årsklasser laksefisk. Dette som følge av en naturtilstand med godt egnede substratforhold, full kontinuitet for vandrende gytefisk og tilfredsstillende vannkvalitet som ikke begrenser produksjonen av fisk i større grad. For

vassdragsystemer med store og små vann knyttet sammen eller forbundet med mindre elve-/bekkavsnitt, vil disse småvassdragene ha svært viktige gyte-/rekryteringsfunksjoner for laksefisk i hele det samlede systemet.

For de fleste vannforekomster på Jæren, der substrat og hydromorfologi gjør at det skal forventes gyting og reproduksjon i naturtilstand, vil forekomsten av årsyngel være en nøkkelindikator ved vurdering av økologisk tilstand (Bergan m.fl. i arbeid). Årsyngel av laksefisk vil i vanndirektivsammenheng være den beste indikatoren på fullendt livssyklus for laksefisk, og integrerer kontinuitet og frie vandringsveier, samt en akseptabel miljø- og vannkvalitet, ved tilstedeværelse i tilfredsstillende tettheter. Årsyngel vil således være en avgjørende parameter for vannforekomster som fortrinnsvis har gyte-rekrutteringsfunksjon, der bortfall eller reduksjon av eldre årsklasser ikke nødvendigvis kan settes i sammenheng med antropogene påvirkninger.

Tilstedeværelsen av flere årsklasser med tilfredsstillende tetthet vil også ha utsagnskraft, men for mindre vassdrag knyttet til større system, så kan det i mange tilfeller være naturlig forflytninger og bortfall av eldre årsklasser av laksefisk, som ikke kan settes i sammenheng med antropogene påvirkninger.

Som følge av at den nye tilnærningsmåten til vurdering av økologisk tilstand ved bruk av laksefisk ikke er ferdigstilt, så kan denne ikke benyttes på materialet fra 2010 for å få frem en miljøtilstand på de enkelte vassdragsavsnittene som ble undersøkt. Vi har imidlertid benyttet fiskedataene fra denne undersøkelsen til en foreløpig vurdering i tråd med erfaringene fra det pågående arbeidet.


Det vil etter hvert komme føringer til bl.a. tidspunkt, vannførings- og temperaturforhold for gjennomføring av vanndirektivrelaterte, kvantitative elfiskeundersøkelser. Ved gjennomføringen av 2010-undersøkelsene var disse forutsetningene noe ugunstige. Vannføringen var noe høy (over middels), vanntemperaturen lav (ned mot 4 grader i noen vannforekomster) og tidspunktet (medio november) litt senere enn det som sannsynligvis vil kreves for at resultatene skal gi en tilfredsstillende vurdering av miljøkvalitet og klassifisering av økologisk tilstand.

Resultater


Bunndyrfaunaen

Komplett artsliste over bunndyrfaunaen er vedlagt bakerst i rapporten (vedlegg xx).

Figur 1 viser en oversikt over antall registrerte taxa (arter og slekter) av døgn-, stein- og vårfuer på den enkelte stasjon i hvert vassdrag. Figur 2 viser stasjonenes ASPT-score for bunndyrfaunaen, der tabell 2 angir tallverdiene for ASPT- med tilhørende EQR-score for bunndyrfaunaen. Disse verdiene gir grunnlaget for klassifisering til økologisk tilstand.



Figur 1. Antall registrerte taxa av døgn-, stein- og vårfluer på undersøkte stasjoner i vassdrag på Jæren i 2010.



Figur 2. Bunndyrfaunaens ASPT-score på undersøkte stasjoner i 2010. Grenseverdiene for tilstandsklassene God/Moderat og Dårlig/Meget dårlig er angitt med heltrukken linje.

Tabell 2. ASPT-verdier med korresponderende EQR verdi for den enkelte stasjonens bunndyrfauna, med fargekoder etter femdelt skala for økologisk tilstand.

| Vassdrag | EQR | ASPT |
|--------------------------|------|------|
| Ims-Lutsi:Svilandsåna | 0,93 | 6,40 |
| Storåna | 0,67 | 4,64 |
| Figgjo: Auestad | 0,88 | 6,05 |
| Figgjo: Straumåna | 0,83 | 5,70 |
| Figgjo: Gjesdalbekken | 0,96 | 6,64 |
| Figgjo: Innløp Grudavatn | 0,86 | 5,96 |
| Orre: Frøylandsåna | 0,79 | 5,42 |
| Orre: Ved utløp | 0,70 | 4,83 |

Fiskesamfunn: Yngel-/ungfisk av laksefisk

Tabell 3 Tetthet av ørret i vassdrag på Jæren høsten 2010.

| Vassdrag på Jæren | | | Estimert tetthet (antall individer per 100 m ²) | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|
| Vassdrag | Lokalitet | Areal (m ²) | Laks | | Ørret | | Ål |
| | | | 0+ | ≥ 1+ | 0+ | ≥ 1+ | |
| Ims-Lutsi | Svilandsåna v/Sviland | 71 | - | - | 28,1 ± 4,1 | 11,8 ± 26,7 | - |
| Storåna | Ved jernbane | 118 | - | - | 1,7 ± 0 | 7,1 ± 16,1 | - |
| Figgjo | Ved Auestad | 108 | - | - | 5,7 ± 0,9 | 5,6 ± 0,3 | - |
| Figgjo | Straumåna v/Straumheia | 58 | 11,3 ± 4,3 | 7,5 ± 3,5 | 14,4 ± 32,6 | 7,5 ± 3,5 | 8,6* |
| Figgjo | Gjesdalbekken v/Gjesdal | 129 | 8,1 ± 1,4 | 12,1 ± 1,8 | 3,9* | 3,9 ± 0,3 | - |
| Figgjo | Ved innløp Grudavatn | 93 | 18,9 ± 7,6 | 7,0 ± 2,7 | - | - | 20,2 ± 9,9 |
| Orrevassdraget | Frøylandsåna | 145 | - | - | 5,5 ± 0,2 | 9,0* | 0,69* |
| Orrevassdraget | Ved utløp | | | | | | |

*observerte verdier

Tabell 4. Sammenslått tetthet av laksefisk (ørret/laks) i vassdrag med tilstedeværelse av begge arter.

| Vassdrag på Jæren med både laks og ørret registrert | | | Estimert tetthet (ant. individer per 100 m ²) | |
|---|---------------|-------------------------|---|------------|
| | | | Laksefisk (ørret + laks) | |
| Vassdrag | Lokalitet | Areal (m ²) | 0+ | ≥ 1+ |
| Figgjo | Straumåna | 58 | 23,1 ± 13,1 | 15,0 ± 5,0 |
| Figgjo | Gjesdalbekken | 129 | 19,4 ± 25,5 | 16,0 ± 1,5 |

Vurdering av resultater

Ims- Lutsi: Svilandsåna

Bunndyr

Det ble registrert minimum 26 EPT- taxa på stasjon Svilandsåna på prøvetakingstidspunktet, hvorav hhv. 5 døgn-, 11 stein- og 10 vårfluetaxa. Antall bunndyr per prøve var innenfor det normale, med 3893 ind. per prøve. Dominerende bunndygrupper var døgnfluer, med 1190 individer per prøve. Døgnfluefaunaen var karakterisert ved arter i familien Baetidae, der enkeltindivider i slektene Caenis og Paraleptophlebia også ble registrert. Steinfluefaunaen var svært artsrik, med tilfredsstillende antall individer per prøve, der arter i slektene Amphinemura og Leuctra dominerte. *Dinocras cephalotes*, Norges største steinflue, ble registrert i Svilandsåna. Vårfluetfaunaen var artsrik og jevnt fordelt med hensyn til antall individer per prøve, fortrinnsvis dominert av arten *Rhyacophila nubila* på undersøkelsestidspunktet.


Bunndyrfaunaen viser få tegn til eutrofiering, og avviker kun i liten grad fra forventet naturtilstand. Følsomme taxa er til stede med tilfredsstillende forekomster, og det biologiske mangfoldet av EPT er meget høyt. Bunndyrfaunaen scorer 6,4 på ASPT-indeksen, tilsvarende en EQR verdi på 0,93. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **God** på undersøkelsestidspunktet.

Yngel- og ungfish

Fiskeundersøkelsene i Svilandsåna indikerer at fiskesamfunnet i dette vassdraget har en tilfredsstillende tilstand på undersøkelsestidspunktet. Det ble kun registrert ørret i vassdraget, og total fangst var 24 individer, fordelt på flere aldersklasser (Figur 3). Avfisket areal var 71 m². Det ble målt moderate tettheter av både årsyngel (28,1 ind/100m²) og eldre ungfish av ørret (11,8 ind./100m²). De registrerte tetthetene er noe lave i forhold til forventingen i et tilsvarende system i sin naturtilstand, men lav vanntemperatur, høy vannføring og tilstedevarsel av større gyteørret i stasjonsområdet kan gi lavere målt tetthet enn hva som er reelt på undersøkelsestidspunktet. Det ble registrert flere større gytefisk (300 gr- 1000 gr) i stasjonsområdet, og flere gytegropes ble dessuten påvist. Sidegreina som kommer inn i stasjonsområdet og munningsområdet til denne i hovedelva vurderes som svært viktig i denne forbindelsen. Vassdraget har en viktig økologisk funksjon for laksefisk av både stasjonær form (bekkeørret) og vandrende ørret fra Kyllesvatnet. Basert på resultatene fra 2010, så vurderer vi denne funksjonen som tilfredsstillende. Tilgangen for anadrom laksefisk til vassdraget har vi ingen kunnskap om. Stasjonområdet er lokalisert et stykke (500-600 meter) oppstrøms Kyllesvatnet, og dette vassdraget er svært viktig som gyte-/rekryteringsvassdrag for ørretbestanden i Kyllesvatnet, med oppgang av større gytefisk herfra. Vi har ikke oversikt over om det settes ut fisk eller foregår andre fiskeforsterkende tiltak i vassdraget som kan påvirke våre resultater og vurderingen av disse. Basert på 2010 resultatene så vurderes tilstanden for fiskesamfunnet i dag å være tilfredsstillende i forhold til et framtidig miljømål i henhold til ny vannforskrift og vanndirektivet, med forbehold om at det ikke er større brudd på kontinuitet og mht vandringsveier for laksefisk oppstrøms stasjonområdet.



Foto: Stasjonområde i Svilandsåna (til venstre) og sideløp (til høyre)



Figur 3. Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte ørret i Svilandsåna.



Foto: Flere gytefisk av ørret ble påvist i stasjonsområdet, og det ble observert gyteaktivitet og gytegroper.

Storåna: Ved jernbane

Bunndyr


Det ble registrert minimum 8 EPT-taxa på stasjon Storåna på prøvetakingstidspunktet. Ingen steinfluer ble registrert, men det ble funnet 1 døgn - og 7 vårfluetaxa i prøvematerialet. Antall bunndyr per prøve var normalt, med 5155 ind. per prøve. Dominerende bunndyrggrupper var imidlertid fåbørstemark, som utgjorde hele 63 % av antall registrerte bunndyr. Døgnfluefaunaen var kun representert ved arten *Baetis rhodani* med relativt lavt antall per prøve. Steinfluefaunaen var fullstendig fraværende. Vårfluetaxaen var moderat til stede med beskjedne antall per prøve, der arten *Hydropsyche siltalai* ble registrert med høyest antall.

Bunndyrsamfunnet på denne stasjonen viser store tegn på ytre, antropogen belastning og forstyrrelser, og avviker betydelig fra en forventet naturtilstand. Det biologiske mangfoldet er svært redusert, der følsomme taxa av blant annet steinfluer ikke er tilstede. Tolerante bunndyrtaxa med lav ASPT-score dominerer bunndyrfaunaen, og en sterk forskyvning av dominansforhold registreres. Bunndyrfaunaen scorer 4,64 på ASPT-indekset, tilsvarende en EQR verdi på 0,67. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **Dårlig**, og ganske nære en tilstand som klassifiseres som Meget Dårlig, på undersøkelsestidspunktet

Yngel- og ungfisk

Fiskeundersøkelsene i Storåna indikerer at fiskesamfunnet i dette vassdraget er svært påvirket og redusert på undersøkelsestidspunktet. Det ble registrert et enkeltindivid av ål (*Anguilla anguilla*), skrubbe (*Platichthys flesus*) og trepigget stingsild (*Gasterosteus aculeatus*) på dette elveavsnittet. Av laksefisk ble kun ørret registrert i vassdraget, og total fangst var kun 7 individer fordelt på to antatte aldersklasser (Figur 4). Avfisket areal var 118 m². Dette gir svært lav estimert tetthet av antatt årsyngel av ørret (1,7 ind/100m²), noe som indikerer at det ikke skjer vellykket gyting eller overlevelse av fjorårets eventuelle yngelproduksjon i stasjonsområdet. Stasjonsområdet vurderes å ha gode substratmessige forutsetninger for gyting og rekruttering i naturtilstand, men kanalisering og utretting bidrar negativt til bl.a. økt erosjon, nedslamming og tiltetting av substrat. Eldre ørret registreres også med moderat til lave tettheter (7,1 ind/100m²) i forhold til forventingen i vassdrag med tilsvarende hydromorfologiske egenskaper. De registrerte tetthetene er typisk for påvirkede vassdragsavsnitt som av vannkjemiske eller hydromorfologiske årsaker ikke har livsvilkår for fullendt livssyklus av laksefisk, der spredning av fisk fra ovenforliggende, mindre påvirkede områder av elva utgjør fiskesamfunnet på stasjonen.

Ut fra våre resultater vurderes tilstanden til fiskesamfunnet i Storåna å avvike betydelig fra et framtidig miljømål iht. ny vannforskrift og vanndirektivet.



Figur 4. Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte ørret i Storåna.

Vår vurdering av Storåna er at vassdraget ved en naturtilstand skulle ha hatt en veltuviklet, livskraftig bestand av laksefisk, fortrinnsvis anadrom ørret og/eller laks, nedstrøms evt naturlige vandringshinder og i stasjonsområdet. Dagens vannkjemiske tilstand kan være for dårlig for en slik etablering i dag, men i forhold til den nye vannforskriften blir det også svært viktig å kartfeste antropogene inngrep og problempunkter som kan skape brudd for fiskevandringer i vassdraget. Vanndirektivet setter stor fokus på hydromorfologiske endringer og deres strukturerende egenskaper på fiskesamfunnet. Vårt erfaringsgrunnlag for Storåna må derfor synliggjøres bedre, slik at potensielle problempunkter langs hele elvelengden kan identifiseres i tråd med ny vannforskrift.



Foto: Stasjonsområdet i Storåna har betydelig parkpreg. Mesteparten av kantvegetasjonen er fjernet og elveløpet er kanalisiert og forbygd, noe som kan ha svært strukturerende påvirkning på vassdragets populasjon av laksefisk i dette avsnittet.



Foto: Parallelt, trolig opprinnelig hovedløp, nå sideløp, nedstrøms stasjonsområdet i Storåna, som har meget gunstig substrat og hydromorfologi for fullendt livssyklus for laksefisk. Søk med elfiskeapparatet i dette sideløpet ga imidlertid ingen fangst av yngel-/ungfisk av laksefisk, men ett individ av ål (ca 30-40 cm) ble registrert her.

Storåna bør, slik vi tolker den nye vannforskriften og i forhold til kriteriegrunnlaget (Skarbøvik m.fl. 2006, Syversen 2007), vurderes i forhold til hvorvidt hele eller deler av vannforekomsten skal ha status som Sterkt Modifisert Vannforekomst (SMVF). Nedre deler har sterkt parkpreg, er betydelig kanalisert og modifisert i forhold til naturtilstanden. Dersom disse forholdene ikke er opp til vurdering per i dag, anbefaler vi at en vurdering av dette foretas, slik at miljømålet for vannforekomsten kan fastsettes.

Figgjo: Ved Auestad

Bunndyr

Det ble registrert minimum 23 EPT-taxa på stasjonen i Figgjo ved Auestad på prøvetakings-tidspunktet, hvorav hhv. 4 døgn-, 9 stein- og 10 vårfluetaxa. Antall bunndyr per prøve var innenfor det normale, med 4334 ind. per prøve. Dominerende bunndyrgrupper var døgnfluer, med 2129 individer per prøve. Døgnfluefaunaen var karakterisert ved sterk dominans av arter i familien Baetidae, fortrinnsvis *B. rhodani*. Steinfluefaunaen var artsrik, med tilfredsstillende antall individer per prøve, der individer i slekten *Amphinemura* dominerte. Vårfluetfaunaen var artsrik og dominert av arten *Itytrichia lamellaris*.

Bunndyrfaunaen viser kun svake tegn til eutrofiering, og avviker kun mindre fra en forventet naturtilstand. Følsomme taxa er til stede med tilfredsstillende forekomster, og det biologiske mangfoldet av EPT er høyt. Bunndyrfaunaen scorer 6,05 på ASPT-indeksen, tilsvarende en EQR verdi på 0,88. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **God** på undersøkelsestidspunktet.


Yngel- og ungfisk

Fiskeundersøkelsene i Figgjo ved Auestad indikerer at fiskesamfunnet i dette vassdraget er redusert, og noe under forventning på undersøkelsestidspunktet. Det ble kun registrert ørret ved elfisket, og total fangst var 12 individer, fordelt flere aldersklasser (Figur 5). Avfisket areal var 108 m². Det ble målt lave tettheter av både årsyngel (5,7 ind/100m²) og eldre ungfisk av ørret (5,6 ind/100m²). Dette er noe avvikende fra forventingen vi har til et tilsvarende system i en naturtilstand. Tilstedeværelse av flere årsklasser inkludert årsyngel indikerer at systemet har en økologisk funksjon som fungerer, men at produksjonen i stasjonsområdet er under vår forventning. Elveavsnittet vurderes å ha et stein- og grusdominert substrat med gunstige forutsetninger for gyting-/rekuttering og oppvekst. Det registreres imidlertid betydelig tiltetting av finere substrat (sand) mellom hulrom i grus og steinsubstrat, noe som reduserer skjulmuligheter og overlevelse for laksefisk. Hvorvidt dette er naturlig i dette systemet eller som følge av antropogene hydromorfologiske endringer har vi ingen kjennskap til.



Foto: Stasjonsområde i Figgjo ved Auestad.

Erfaringsgrunnlaget vårt for dette avsnittet av vassdraget og vannforekomsten forøvrig er kun en gangs undersøkelse og befaring. Dette er for lite til at vi her kan peke på direkte årsaker til de lave tetthetene og forekomsten av ørret som ble registrert i våre undersøkelser i 2010. Bunndyrsamfunnets gode økologiske tilstand gjør derimot at vannkvalitet vurderes som en mindre sannsynlig årsak. Tilstanden for fiskesamfunnet i dag vurderes å være noe avvikende i forhold til et framtidig miljømål i henhold til ny vannforskrift og vanndirektivet slik vi vurderer det, men større erfaringsgrunnlag gjennom flere års fiskeregistreringer kombinert med utvidet stasjonsnett vil behøves i et slikt stort vassdragssystem, for å foreta en sikrere vurdering.



Figur 5. Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte ørret i Storåna.

Figgjo: Straumåna v/ Straumheia


Det ble registrert minimum 20 EPT-taxa på stasjonen i Straumåna på prøvetakingstidspunktet, hvorav hhv. 3 døgn-, 7 stein- og 10 vårfluetaxa.

Antall bunndyr per prøve var normalt, med 3209 ind. per prøve. Dominerende bunndyrggrupper var døgnfluer, med 1368 individer per prøve. Døgnfluefaunaen var karakterisert ved arter i familien Baetidae og slekta Caenis. Steinfluefaunaen var moderat artsrik, med tilfredsstillende antall individer per prøve, der arter i slektene Amphinemura og Leuctra dominerte. Vårfluefaunaen var artsrik, fortrinnsvis dominert av to arter i familien Hydropsychidae, samt arten *Rhyacophila nubila*.

Bunndyrfunaen viser kun svake tegn til eutrofiering, men avviker noe fra en forventet naturtilstand. Det biologiske mangfoldet av EPT er tilfredsstillende, men enkelte følsomme taxa som forventes å være tilstede, registreres ikke. Tolerante bunndyrtaxa med lav ASPT-score er noe overrepresentert i bunndyrfunaen. Bunndyrfunaen scorer 5,7 på ASPT-indeksen, tilsvarende en EQR verdi på 0,83. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **Moderat**, men samtidig nært opp til God tilstand, på undersøkelsestidspunktet.

Yngel- og ungfish

Fiskeundersøkelsene i Straumåna v/Straumheia viser at fiskesamfunnet i dette vassdraget har fullendt livssyklus for laksefisk, med tilfredsstillende økologisk funksjon i dag. Tettheten av årsyngel er derimot noe under forventning på undersøkelsestidspunktet. Det ble registrert både ørret, laks og ål ved elfisket, noe som indikerer frie vandringsveier til sjøen, og total fangst var 14 individer av laksefisk, fordelt på flere aldersklasser (Figur 5). Av dette var 8 laks og 6 ørret, noe som indikerer ingen spesiell dominans for noen av artene i dette avsnittet av vassdraget. Avfisket areal var 58 m², og var begrenset til nær elvekanten som følge av høy vannføring og vanskelig elfiskeforhold. Det ble målt moderate tettheter (laks og ørret sammenslått) av årsyngel (23,1 ind./100m²), mens eldre ungfish ble registrert med tilfredsstillende forekomst (15,0 ind./100m²). Det er sannsynlig at høy vannføring og lav vanntemperatur kan ha gitt for stort avvik i estimert tetthet i forhold til reell tetthet. Dette er forhold som kan gi svært redusert fangbarhet ved elfiske, og spesielt da for fisk med liten kroppsstørrelsene, men også påvirker dette fangbarheten for større fisk. Det ble registrert vellykket gyting denne høsten noe oppstrøms stasjonsområdet, der vi påviste gytefelt/grop og nedgravd rogn (i bunndyrprøvene). Våre resultater, forholdene tatt i betraktning, indikerer at fiskesamfunnet i dette stasjonsområdet av Straumåna er lite avvikende i forhold til et framtidig miljømål etter ny vannforskrift, men vi vil påpeke at erfaringsgrunnlaget fra vassdraget bør økes for en sikrere vurdering av økologisk tilstand.



Figur 5. Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte laks (øverst) og ørret i Straumåna.



Foto: Stasjonsområde i Straumåna, men noe høy vannføring og vanskelige elfiskeforhold.



Foto: Stasjonsområdet i Straumåna sett nedover mot utløp til Edlandsvatnet.

Ål

Det ble fanget 4 ål i størrelsesorden 15-25 cm under elfisket, noe som gir en observert tetthet på 8,6 ind/100m². Dette er en indikasjon på at vassdraget har en viktig funksjon i forhold til denne arten. I den forbindelse registrerer vi at demningen oppstrøms stasjonsområdet, ved utløpet fra Klugevatn til Straumåna, kan medføre vanskeligheter for oppvandring av ål. Demningen er plassert oppstrøms naturlig vandringshinder for anadrome laksefisk, men ikke for ål. Dermed vil store produksjonsarealer som opprinnelig er brukt av ål oppstrøms demningen i naturtilstand dag ikke være tilgjengelige for arten. Ål er som nevnt rødlistet, og det hviler et større forvaltningsansvar av arten for Norge, der framtidig fokus på forvaltning av ål vil måtte økes i tråd med den nye vannforskriften.



Foto: Demningen ved utløpet av Klugevatn tar lite hensyn til ålevandringer slik den framstår i dag, og det er usikkert om arten kan passere installasjonen.

Figgjo: Gjesdalbekken v/ Gjesdal

Bunndyr

Det ble registrert minimum 28 EPT- taxa på stasjonen i Gjesdalbekken på prøvetakingstidspunktet, hvorav hhv. 7 døgn-, 9 Stein- og 12 vårfluetaxa.

Antall bunndyr per prøve var innenfor det normale, med 5947 ind. per prøve. Dominerende bunndyrgasser var døgnfluer, med 1862 individer per prøve. Døgnfluefaunaen var karakterisert av flere arter i familien Baetidae, med stor dominans av *B. rhodani*. Små individer i familien Leptophlebiidae ble også registrert. Steinfluefaunaen var artsrik, med tilfredsstillende antall individer per prøve, der arter i slektene Amphinemura, Leuctra og arten *Brachyptera risi* ble registrerte med størst forekomst. Vårfluetaxaen var svært artsrik og jevnt fordelt med hensyn til antall individer per prøve, der arten *Rhyacophila nubila* og små individer i familien Limnephilidae ble registrert med høyest antall.

Bunndyrfaunaen viser få tegn til eutrofiering, og avviker kun i liten grad fra forventet naturtilstand. Følsomme taxa er til stede med tilfredsstillende forekomster, og det biologiske mangfoldet av EPT er svært høyt. Bunndyrfaunaen scorer 6,64 på ASPT-indeksen, tilsvarende en EQR verdi på 0,96. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **God** på undersøkelsestidspunktet.


Yngel- og ungfish

Fiskeundersøkelsene i Gjesdalbekken viser at fiskesamfunnet i dette vassdraget har fullendt livssyklus for laksefisk, med tilfredsstillende økologisk funksjon i dag. Tettheten av årsyngel er derimot noe under forventning på undersøkelsestidspunktet. Det ble registrert både ørret og laks ved elfisket, noe som indikerer frie vandringsveier til sjøen, der total fangst var 33 individer, fordelt på flere aldersklasser (Figur 6). Av dette var 24 laks og 9 ørret, noe som indikerer at laks dominerer fiskesamfunnet i dette vassdraget. Avfisket areal var 129 m². Det ble målt moderate tettheter (laks og ørret samlet) av årsyngel (19,4 ind/100m²), mens eldre ungfish ble registrert med tilfredsstillende forekomst (16 ind./100m²), noe indikerer god overlevelse i vassdraget.

Det er sannsynlig at lav vanntemperatur kan ha gitt noe avvik i estimert tetthet i forhold til reell tetthet, da slike forhold kan gi svært redusert fangbarhet ved elfiske. Dette gjelder spesielt for fisk med de minste kroppsstørrelsene, men også for større fisk. De partier av stasjonsområdet hvor det ble registrert mest fisk hadde større stein som dominerende substratttype. Ved lav vanntemperatur har fisk (under elfiske) erfaringsmessig større sannsynlighet for å bli liggende innunder og mellom disse, uten at vi oppdager dem. Gjesdalbekkens substrat bærer preg av å ha en del tiltetting av finere materiale (sand) i hulrom mellom stein og større grus. Dette er forhold som kan redusere skjulmuligheter og vassdragets evne til å holde laksefisk. Vi er ikke kjent med om dette er naturlig eller kommer av antropogene hydromorfologiske påvirkninger og/eller er et resultat av en manipulering av en naturlig vannføring gjennom regulering.

Vi registrerte også at kantvegetasjonen var nedbeitet eller fjernet langs store deler av Gjesdalbekken. Dette er forhold som kan redusere fiskesamfunnet betraktelig i et vassdrag. Vurderingen av tilstanden i kantevegetasjon er et av mange hydromorfologiske støtteparametre for elver og mindre vassdrag ihht til vannforskriften. Retablering av en intakt kantvegetasjon med buffersone mot dyrket mark eller beitemark bør i høyeste grad vurderes som aktuelle tiltak for å eventuelt oppnå og ikke minst opprettholde framtidige miljømål i Gjesdalbekken.

Våre resultater fra høsten 2010 indikerer at fiskesamfunnet i stasjonsområdet Gjesdalbekken har mindre avvikende i forhold til et framtidig miljømål etter ny vannforskrift, men erfatingsgrunnlaget fra vassdraget bør økes for sikrere vurdering.



Figur 6. Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte laks (øverst) og ørret (nederst) i Gjesdalbekken



Foto: Stasjonsområde i Gjesdalbekken, med betydelig redusert kantvegetasjon.



Foto: Gjesdalbekkens substrat preges av en betydelig tiltetting av finere materiale som følge av tilførsler fra større forekomster av sand i/ved vassdraget. Dette er forhold som kan redusere vassdragets evne til å holde og produsere laksefisk. Det påvirker også vassdragets bunndyrfauna og reduserer vassdragets selvrensingsevne. Vi har ikke kjennskap til om dette er naturlig eller som følge av en antropogen påvirkning.

Figgjo: Ved innløp Grudavatn


Det ble registrert minimum 24 EPT-taxa på denne stasjonen i Figgjo ved innløpet til Grudavatn på prøvetakingstidspunktet, hvorav hhv. 6 døgn-, 6 Stein- og 12 vårfluetaxa.

Antall bunndyr per prøve var innenfor det normale, med 7236 ind. per prøve. Dominerende bunndyrgrupper var døgnfluer, med 2594 individer per prøve. Døgnfluefaunaen var karakterisert ved en dominans av artene *Caenis luctuosa* og *B. rhodani*. Steinfluefaunaen var moderat artsrik, med noe lavt antall individer per prøve, der individer i slektene Amphinemura og Chloroperlidae ble registrert med høyest antall. Vårfluetaxaen var svært artsrik, der artene *Hydropsyche siltalai* og *Lepidostoma hirtum* ble registrert med høyest antall individer.

Bunndyrfaunaen viser kun svake tegn på påvirkning, men avviker noe fra forventet naturtilstand. Følsomme taxa er til stede med tilfredsstillende forekomster, og det biologiske mangfoldet av EPT er høyt. Andelen tolerante bunndyrtaxa er derimot noe stor. Bunndyrfaunaen scorer 5,97 på ASPT-indiksen, tilsvarende en EQR verdi på 0,86. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **Moderat**, men svært nær God tilstand, på undersøkelsestidspunktet.

Yngel- og ungfisk

Fiskeundersøkelsene i Figgjo ved innløpet til Grudavatn viser at fiskesamfunnet i dette vassdraget i dag har fullendt livssyklus for laksefisk. Det ble kun registrert laks og ål ved elfisket, noe som indikerer frie vandringsveier til sjøen. Total fangst var 22 individer av laks fordelt på flere aldersklasser (Figur 7) og 10 ål. Avfisket areal var 129 m². Det ble målt moderate til lave tettheter av årsyngel (18,9 ind/100m²) og eldre ungfisk (7,0 ind./100m²) av laks.



Figur 7 Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte laks i Figgjo ved Grudavatnet.

Dette avsnittet av Figgjo bærer preg av en betydelig tiltetting av hulrom mellom mindre stein og grus, forårsaket av sand og finere materiale. Stasjonsområdet domineres av mindre substratstørrelser som småstein og grus, og grovere substrat som storstein er omtrent fraværende. Stasjonsområdet har trolig forutsetninger for både gyte-/rekruttering og oppvekst i naturtilstand. Mesteparten av den registrerte yngel-/ungfisken ble fanget i tilknytning til og innimellom kantvegetasjonen/sivbeltet langs stasjonsområdet, hvor skjul forekommer. Det ble registrert gytegropar i stasjonsområdet, noe som viser at dette avsnittet har gyting-/rekruttering av stedegen laksefisk i Figgjo.

Resultatene våre fra 2010 viser at det er fullendt livssyklus for laksefisk på elveavsnittet, men at forekomsten av yngel-/ungfisk er noe lav i forhold til en forventet naturtilstand. Usikkerheten rundt hva man skal forvente av dette elveavsnittet når det gjelder tetthet og forekomst av laksefisk ved en antatt naturtilstand er imidlertid tilstede. Dette gjelder også om den observerte tiltettingen av substratet m.m. skyldes antropogene hydromorfologiske påvirkninger eller ikke.

Et framtidig miljømål vurderes å være innenfor rekkevidde i denne delen av vassdraget basert på undersøkelsene i 2010, men erfaringsgrunnlaget er for lite til å konkludere noe mer presist på dette nå. Dette avsnittet av Figgjovassdraget bør dessuten avklares i forhold til status som SMVF, med tilhørende miljømål, da gitt som GØP.

Ål

Det ble registrert 10 individer av ål i størrelsesorden 10-40 cm på stasjonen. Dette gir en estimert tetthet av ål på 20,2 ind/100m², noe som vurderes som høyt, selv om det foreligger lite bakgrunnsmateriale og referanseverdier på kvantitative målinger på ål. Figgjovassdraget vurderes å ha en regional viktig betydning for ål, noe framtidig forvaltning av vassdraget må ta høyde for ihht den nye vannforskriften. I denne sammenhengen bør det derfor vies oppmerksomhet rundt opp- og nedstrøms ålevandringer i Figgjovassdraget i forhold til vannforskriften. Vi er ikke kjent med hvorvidt dette er kartlagt eller vurdert i Figgjovassdraget som en helhet, og viser til bl.a. omtalen av demningen i utløpet av Klugevatn, under avsnittet om Straumåna.



Foto: Stasjonsområde i Figgjo ved innløp Grudavatn, med gytegrop innfelt til høyre.

Orrevassdraget: Frøylandsåna

Bunndyr

Det ble registrert minimum 17 EPT-taxa på stasjon i Frøylandsåna på prøvetakingstidspunktet, hvorav hhv. 3 døgn-, 8 stein- og 6 vårfluetaxa.


Antall bunndyr per prøve var normalt, med 7754 ind. per prøve. Dominerende bunndyrggrupper var døgnfluer, med 2707 individer per prøve. Døgnfluefaunaen var karakterisert ved arter i familien Baetidae, der *B. rhodani* dominerte sterkt i antall. Steinfluefaunaen var moderat artsrik, med tilfredsstillende antall individer per prøve, der arter i slektene Amphinemura og Leuctra dominerte. Vårfluetfaunaen var fortrinnsvis dominert av artene *Rhyacophila nubila* og *Hydropsyche siltalai*.

Bunndyrfunaen viser kun svake tegn til eutrofiering, men avviker noe fra en forventet naturtilstand. Det biologiske mangfoldet av EPT er tilfredsstillende, men enkelte følsomme taxa som forventets å være tilstede, registreres ikke. Tolerante bunndyrtaxa med lav ASPT-score er noe overrepresentert i bunndyrfunaen. Bunndyrfunaen scorer 5,42 på ASPT-indeksen, tilsvarende en EQR verdi på 0,79. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **Moderat** på undersøkelsestidspunktet.

Yngel-/ungfisk

Fiskeundersøkelsene i Frøylandsåna indikerer at fiskesamfunnet i dette vassdraget kan være noe redusert på undersøkelsestidspunktet. Det ble kun registrert ørret og et enkeltindivid av ål på elveavsnittet. Total fangst av ørret var 22 individer fordelt på flere årsklasser (Figur 8). Avfisket areal var 145 m². Dette gir en lav estimert tetthet av antatt årsyngel av ørret (5,5 ind./100m²), noe som indikerer at det ikke skjer vellykket gyting eller overlevelse av fjorårets forventede yngelproduksjon i stasjonsområdet. Dette avviker svært fra vår forventning til dette vassdraget, da stasjonsområdet

vurderes å ha svært gode substratmessige forutsetninger for gyting og rekruttering ved en naturtilstand. Med anadrom tilgang av større gytefisk så skal det forventes en årsyngeltetthet som er betydelig høyere enn våre registrerte tettheter. Eldre ørret registreres også kun med moderate tettheter (9,0 ind./100m²) i forhold til forventingen i vassdrag med tilsvarende hydromorfologiske egenskaper og livsvilkår, noe som gir ytterligere indikasjon på at systemets fiskesamfunn er forstyrret. Det ble registrert et enkelt individ av ål, noe som gir en observert tetthet på 0,69 ind./100m², i stasjonsområdet. Dette viser at Orrevassdraget kan ha en større eller mindre betydning for denne arten, og at ålen har frie vandringsveier fram til stasjonsområdet i Frøylandsåna.



Figur 8. Lengdefordeling, antatt alder og antall registrerte laks i Frøylandsåna.

Resultatene våre tyder på at det er lav eller sviktende rekruttering i Frøylandsåna og en ustabil aldersklassestruktur, uten at vi gjennom undersøkelsene i 2010 kan peke på direkte årsaker til dette. De registrerte tetthetene er typisk for påvirkede vassdragsavsnitt, som av vannkjemiske eller hydromorfologiske årsaker opplever forstyrrelser og reduksjon i bestanden av laksefisk. Ut fra resultatene vurderes tilstanden til fiskesamfunnet i Frøylandsåna per i dag å avvike fra et framtidig miljømål iht. ny vannforskrift og vanndirektivet. Erfaringsgrunnlaget bør imidlertid økes for å kunne gi et bedre vurderingsgrunnlag for bestemmelse av vannforekomstens økologiske tilstand.



Foto: Stasjonsområde i Frøylandsåna. Vassdraget har svært gode forutsetninger for høy produksjon av laksefisk, fortrinnsvis ørret, men har en tynn bestand med ustabil rekruttering i 2010.

Orrevassdraget ved utløp

Det ble på prøvetakingstidspunktet registrert minimum 12 EPT-taxa på stasjon i Orrevassdraget ved utløp, hvorav hhv. 3 døgn- og 9 vårfluetaxa. Ingen steinfluer ble registrert.

Antall bunndyr var normalt, med 5917 ind. per prøve. Dominerende bunndyrggrupper var fjærmygg og fåbørstemark, som utgjorde om lag halvparten av antall registrerte bunndyr. Døgnfluefaunaen var kun representert ved arten *Baetis rhodani* og arter i slekta *Caenis*. Steinfluefaunaen var fullstendig fraværende. Vårfluefaunaen var artsrik, fortrinnsvis dominert av to arter i familien *Hydropsychidae*, samt arten *Rhyacophila nubila*.

Bunndyrfunaen viser tegn til eutrofiering, og avviker noe fra en forventet naturtilstand. Det biologiske mangfoldet er noe redusert, der følsomme taxa av blant annet steinfluer ikke er tilstede. Tolerante bunndyrtaxa med lav ASPT-score dominerer bunndyrfunaen, og en forskyvning av dominansforhold registreres. Bunndyrfunaen scorer 4,83 på ASPT-indeksen, tilsvarende en EQR-verdi på 0,7. Dette gir en økologisk tilstand tilsvarende **Dårlig** på undersøkelsestidspunktet

Yngel-/ungfisk

Fiskeundersøkelsene i Orrevassdraget ved utløp gir kun mindre informasjon i forhold til eventuelle påvirkninger som gjør seg gjeldende i vassdraget. Dette elveavsnittet domineres av finere substrat som sand og mindre grus i dag, og trolig er dette også dominerende i en naturtilstand. Lokaliteten tilfredsstiller ikke de krav som settes til en elfiske stasjon og for kvantitatittvelfiske etter yngel-/ungfisk. I tillegg er store partier i dette avsnittet av Orreelva for dypt og for vanskelig til å elfiske tilfredsstillende. De nedre strekningene av dette vassdraget har slik vi ser det få fysiske forutsetninger for gyting-/rekruttering og til å holde velutviklete fiskesamfunn av yngel-/ungfisk av laksefisk, men stasjonsområdet og avsnittet som sådan har en viktig økologisk funksjon som oppvekst og opphold-/refugium for eldre fisk. Det er imidlertid svært vanskelig å måle avvik fra en forventet naturtilstand i forhold til eventuelle påvirkninger med fisk som kvalitetselement på slike strekninger av et vassdrag. Det bør forventes at elveavsnittet har en vannkvalitet som er tilstrekkelig til at eldre ungfisk og voksenfisk har tilhold på dette avsnittet, men en beskrivelse av tetthet og forekomst kan ikke angis nærmere etter vår vurdering uten mer omfattende undersøkelser.

Kvantitative undersøkelser ble derfor av overnevnte grunner ikke foretatt på denne stasjonen. Det ble imidlertid utført søk med elfiskeapparatet og foretatt kvalitative undersøkelser på om lag 200 m² av stasjonsområdet, og 3 eldre ørret med lengder på hhv 240, 240 og 235 mm ble registrert. Dette er eldre ørret, trolig med anadrom livshistorie, som ikke er kjønnsmoden, og som benytter seg av dette elveavsnittet til oppvekst og periodevis oppholdsområde i ulike faser av livssyklusen.



Foto: Gjeldfisk av eldre ørret benytter nedre del av Orrevassdraget som oppvekst og oppholdsområde.



Foto: Stasjonsområdet i Orrevassdraget ved utløp, domineres av finere substrat og dårlige naturlige forutsetninger for tilstedeværelse av yngel-/ungfisk av laksefisk.

Konklusjonen for elveavsnitt i Orrevassdraget ved utløp er at laksefisk som kvalitetselement kun kan ha funksjon som støtteparameter i forhold til en vurdering av miljøkvalitet og økologisk tilstand. En skal forvente tilstedevarsel av laksefisk på avsnittet, fortrinnsvis eldre aldersklasser, men videre angivelse av tethet og forekomst i forhold til miljømål lar seg ikke gjøre ut fra dataene som ble hentet inn i november 2010. Andre kvalitetselementer som f. eks bunndyr eller vannkjemisk tilstand bør ligge til grunn for klassifiseringen av dette partiet av vassdraget ihht til ny vannforskrift..

Litteratur

Armitage, P.D., Moss, D., Wright J.F. and Furse, M. T. 1983. The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running - water sites. Water Research 17:333-347.

Bergan, M.A, Berger, H.M. & Nøst, T.H. (i arbeid). Laksefisk som kvalitetselement på økologisk tilstand i mindre vassdrag. NIVA-rapport, i arbeid.

Bohlin, T, Hamrin, S., Heggberget, T. G., Rasmussen, G. & Saltveit, S. J. 1989. Electrofishing – Theory and practice with special emphasis on salmonids. – Hydrobiologia 173

Frost, S., Huni, A. & Kershaw, W.E. 1971. Evaluation of a kicking technique for sampling stream bottom fauna. – Can. J. Zool. 49.

Iversen, A. (leder) 2009. Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. Veileder 01: 2009: Klassifisering av miljøtilstand vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, innsjøer og elver i henhold til vannforskriften". 181 s.

Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.).2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge.

NS 4719. 1/1988. Bunnfauna - Prøvetaking med elvehåv i rennende vann.

NS-ISO 7828. 1/1994. Metoder for biologisk prøvetaking - Retningslinjer for prøvetaking med håv av akvatiske bunndyr.

NS-EN 14011 1/2003 Vannundersøkelse - Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat

Skarbøvik, E., Glover, B., Barton, D.N., Brabrand, Å., Bækken, T., Halleraker, J.H., Johansen, S.W., Kristiansen, A., Saltveit, S.J. 2006. Forslag til metodikk for fastsettelse av miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster. Med eksempler fra Numedalslågen. NIVA-Rapp. 5266. 84 s.

Syversen, T. (red.). 2007. Metodikk for karakterisering av vannforekomster i Norge. Veileder, SFT.

Zippin, C. 1958. The removal method of population estimation. – J. Wild. Managem. 22.

Vedlegg Artslister

| 15 og 16 november 2010 | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| Taxa | Gjesdalbekken | Figgjo v/ Grudavatn | Frøylandsåna | Orre v/utløp |
| Bivalia | | | | |
| Sphaeriidae | 2 | 32 | 16 | 16 |
| Gastropoda | | | | |
| Acroloxis lacustris | | 16 | 32 | |
| Lymnaeidae | 48 | 64 | 272 | 12 |
| Planorbidae | | 48 | 8 | 1 |
| Hirudinea | | | | |
| Ibler ubestemt | | 16 | | |
| Glossiphonia complanata | | | 8 | |
| Helobdella stagnalis | | 1 | | 24 |
| Annelida | | | | |
| Oligochaeta | 432 | 480 | 1280 | 1504 |
| Isopoda | | | | |
| Asellus aquaticus | | 48 | | 176 |
| Arachnidae | | | | |
| Acari | 80 | 576 | 32 | 32 |
| Ephemeroptera | | | | |
| Centroptilum luteolum | 64 | 32 | | |
| Baetis sp. | 176 | 96 | 128 | |
| Baetis niger | 1 | 48 | | |
| Baetis muticus | 16 | 320 | 48 | |
| Baetis niger/digitatus | 48 | | | |
| Baetis digitatus | 4 | 2 | | |
| Baetis rhodani | 1408 | 560 | 2528 | 352 |
| Caenis sp | 1 | | | |
| Caenis horaria | | | | 48 |
| Caenis luctuosa | | 1536 | | 432 |
| Leptophlebiidae | 144 | | | |
| Paraleptophlebia cincta | | | | |
| Plecoptera | | | | |
| Isoperla sp. | 32 | 4 | 16 | |
| Dinocras cephalotes | | | | |
| Chloroperlidae | | 32 | | |
| Siphonoperla burmeisteri | 80 | | | |
| Taenopteryx nebulosa | | 1 | | |
| Brachyptera risi | 128 | | 64 | |
| Amphinemura sp. | 384 | 8 | 208 | |
| Amphinemura sulcicollis | 128 | 32 | 48 | |
| Nemoura sp | | | 32 | |
| Nemoura avicularis | 3 | | | |
| Protonemura meyeri | 8 | | 32 | |
| Leuctra sp. | 64 | | 144 | |
| Leuctra hippopus | 128 | 1 | 80 | |
| Coleoptera | | | | |
| Coleoptera indet (larve) | 64 | 96 | 96 | |
| Dytiscidae | 4 | | | |
| Gyrinidae (larve) | | 48 | | 16 |
| Elmidae | 272 | 528 | 128 | |

| 15 og 16 november 2010 | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| Taxa | Gjesdalbekken | Figgjo v/ Grudavatn | Frøylandsåna | Orre v/utløp |
| Elmis aenea | 8 | 64 | | |
| Limnius volckmari | | 32 | 16 | |
| Hydraenidae | | | 48 | |
| Trichoptera | | | | |
| Rhyacophila nubila | 96 | 96 | 128 | 224 |
| Agapetus ochripes | 48 | 1 | 16 | |
| Hydroptila sp. | | 32 | | 16 |
| Ithytrichia lamellaris | | | | |
| Oxyethira sp | | 1 | | |
| Psychomyiidae | | | | 8 |
| Lype phaeopa | | | | |
| Tinodes waeneri | 8 | 8 | | |
| Polycentropodidae | 16 | 32 | | 8 |
| Holocentropus dubius | | | | 4 |
| Neureclipsis bimaculata | | | | 80 |
| Plectrocnemia conspersa | 8 | | 8 | |
| Polycentropus flavomaculatus | | 20 | 16 | 2 |
| Hydropsyche siltalai | | 544 | 64 | 432 |
| Hydropsyche pellucidula | | 144 | 32 | 336 |
| Lepidostoma hirtum | 16 | 336 | | |
| Limnephilidae sp. | 64 | | | |
| Apatania sp | 8 | | | |
| Apatania spp.* | | | | |
| Ecclisopteryx dalecarlica | 48 | | | |
| Potamophylax sp. | 4 | | | |
| Potamophylax cingulatus | 16 | | | |
| Sericostoma personatum | 16 | | | |
| Leptoceridae | | 1 | | 64 |
| Athripsodes sp | | 32 | | |
| Diptera | | 48 | | |
| Tipula sp. | 16 | 16 | | |
| Tipulidae | 96 | 4 | 64 | 2 |
| Simuliidae | 352 | 64 | 176 | 96 |
| Ceratopogonidae | 16 | 128 | 2 | 16 |
| Chironomidae | 1392 | 1008 | 1984 | 2016 |
| SUM Bunndyr | 5947 | 7236 | 7754 | 5917 |

| 15 og 16 november 2010 | Svilandsåna | Storåna | Figgjo v/Auestad | Straumåna |
|--------------------------|-------------|---------|------------------|-----------|
| Taxa | | | | |
| Bivalia | | | | |
| Sphaeriidae | 144 | | 24 | 16 |
| Gastropoda | | | | |
| Acroloxis lacustris | | 3 | | |
| Lymnaeidae | 64 | | | 4 |
| Planorbidae | 48 | | 16 | 32 |
| Hirudinea | | | | |
| Igler ubestemt | | 24 | | 8 |
| Glossiphonia complanata | | 1 | | |
| Helobdella stagnalis | | 32 | 48 | |
| Annelida | | | | |
| Oligochaeta | 352 | 3248 | 112 | 112 |
| Isopoda | | | | |
| Asellus aquaticus | | 176 | | 4 |
| Arachnidae | | | | |
| Acari | 4 | 96 | 8 | |
| Ephemeroptera | | | | |
| Centroptilum luteolum | 32 | | | |
| Baetis sp. | 272 | | 512 | 288 |
| Baetis niger | | | | |
| Baetis muticus | | | 1 | |
| Baetis niger/digitatus | | | | |
| Baetis digitatus | | | | |
| Baetis rhodani | 880 | 72 | 1440 | 1072 |
| Caenis sp | | | | |
| Caenis horaria | 4 | | | |
| Caenis luctuosa | | | 176 | 8 |
| Leptophlebiidae | | | | |
| Paraleptophlebia cincta | 2 | | | |
| Plecoptera | | | | |
| Isoperla sp. | 14 | | 32 | 16 |
| Dinocras cephalotes | 4 | | | |
| Chloroperlidae | | | | |
| Siphonoperla burmeisteri | 32 | | 32 | |
| Taenopteryx nebulosa | | | 12 | |
| Brachyptera risi | 16 | | 16 | 8 |
| Amphinemura sp. | 624 | | 320 | 304 |
| Amphinemura sulcicollis | 16 | | 16 | 48 |
| Nemoura sp | 16 | | 8 | |
| Nemoura avicularis | 4 | | | |
| Protonemura meyeri | 8 | | 16 | 56 |
| Leuctra sp. | 16 | | | 48 |
| Leuctra hippopus | 48 | | 16 | 16 |
| Coleoptera | | | | |
| Coleoptera indet (larve) | 112 | | 64 | 24 |
| Dytiscidae | 1 | | | |
| Gyrinidae (larve) | | | | |
| Elmidae | 96 | | 80 | 16 |
| Elmis aenea | 6 | | 16 | |
| Limnius volckmari | | | | |

| 15 og 16 november 2010 | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| Taxa | Svilandsåna | Storåna | Figgjo v/Auestad | Straumåna |
| Hydraenidae | 4 | | | |
| Trichoptera | | | | |
| Rhyacophila nubila | 64 | 4 | 96 | 56 |
| Agapetus ochripes | | | | |
| Hydroptila sp. | | | 16 | |
| Ithytrichia lamellaris | 8 | | 176 | 40 |
| Oxyethira sp | | | 1 | 32 |
| Psychomyiidae | 2 | | | 1 |
| Lype phaeopa | | 2 | | |
| Tinodes waeneri | 3 | 1 | | |
| Polycentropodidae | 48 | | 4 | 48 |
| Holocentropus dubius | | | | |
| Neureclipsis bimaculata | | | | |
| Plectrocnemia conspersa | 16 | 4 | | |
| Polycentropus flavomaculatus | 24 | | 8 | 4 |
| Hydropsyche siltalai | 16 | 14 | 12 | 64 |
| Hydropsyche pellucidula | | 6 | 4 | 32 |
| Lepidostoma hirtum | | | 8 | 16 |
| Limnephilidae sp. | | | 8 | 1 |
| Apatania sp | | | | |
| Apatania spp.* | 12 | | | |
| Ecclisopteryx dalecarlica | | | | |
| Potamophylax sp. | | | | |
| Potamophylax cingulatus | | | | |
| Sericostoma personatum | 12 | | | |
| Leptoceridae | | | | |
| Athripsodes sp | | | | |
| Diptera | 16 | 32 | | |
| Tipula sp. | 4 | | 4 | 2 |
| Tipulidae | 48 | | 8 | 112 |
| Simuliidae | 48 | 16 | 128 | 48 |
| Ceratopogonidae | 1 | 16 | 32 | 1 |
| Chironomidae | 752 | 1408 | 864 | 672 |
| SUM Bunndyr | 3893 | 5155 | 4334 | 3209 |